



กระชาด

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Boesenbergia rotunda* (L.) Mansf.

ชื่อวงศ์ Zingiberaceae

ชื่อสามัญ Kaempfer

ชื่ออื่น กระชาดคำ กระแอน ขิงทราย (มหาสารคาม) จี๊ป ซีฟู
เป่าขอเร้า เป้าสีรีระแอน (กะหรี่ยง-แม่ส่องสอน)

ละแอน (ภาคเหนือ) ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ)

กระชาด ไม้ล้มลุกลงหัว มี ๓ ชนิด คือ กระชาดเหลือง(กระชาดป่า)

กระชาดคำ กระชาดแดง นิยมใช้อาย่างเหลือง

หัว รสเผ็ดร้อนขมอม สรรพคุณ แก้ปากเปื่อย ปากแตกเป็นแผล

ขับรดดูขาว แก้ใจสั่น แก้ปวดมวนในห้อง แก้บิดมูกเลือด บำรุงกำลัง
แรงหรือรากใหญ่ ที่ติดกับหัว รสเผ็ดร้อนขมเล็กน้อย สรรพคุณ

แก้กามatyด้าน ทำให้จิตใจกระชุ่นกระชาด มีคุณสมบัติคล้ายโสมเจี๊ยบ
รับประทานป้องกันการอักเสบของตับได้



กระเข้าฝีเมด



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aristolochia tagala* Cham.

ชื่อวงศ์ ARISTOLOCHIACEAE

ชื่อสามัญ Indian Birthwort

ชื่ออื่น กระเข้าฝีเมด กระเข้ามด (ภาคกลาง)

ลักษณะ ต้นและหัวกระเข้าฝีเมด เป็นพืชรื้นไม้พุ่ม ที่เกาะอยู่กับต้นไม้อื่น โคนของต้นเป็นหัว มีผิวไม่เรียบ
ตะปุ่มตะป่า สีออกน้ำตาลเข้ม ภายในของหัวว่าน กระเข้าฝีเมด จะมีรูพรุน ที่ทะลุถึงกันได้
และเป็นที่อาศัยของมดดำ เนื้อด้านใน ของว่านกระเข้าฝีเมด สีน้ำตาลใหม่ และด้านใต้มีราก
fibrous ประปราย ลำต้นจะงอกออกในส่วนบนของหัวว่าน ลักษณะลำต้นมีผิว ขรุขระสีน้ำตาล
ปนเทา ใบขาวรีปลายมน ใบไม่แข็งมากนัก สีเขียว

กระเข้าฝีเมด หรือหัวร้อยรู ไม่ใช้มีลังหัว เป็นพวงกลวยไม้เป็นโป่งใหญ่ที่ข้อและลำต้น

หัว รสเย็นเบื่อ สรรพคุณ บำรุงหัวใจ ขับชีพจร ขับพยาธิในท้อง แก้พิษในข้อกระดูก
แก้เม็ดประดง



กระดาดทั้ง๒

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Alocasia indica* Schott.

ชื่อวงศ์ Araceae

ชื่อสามัญ Ear elephant, giant taro, ape, giant alocasia, pai

ชื่ออื่น กระดาดเขียว บอนเขียว กระดาดขาว โทปี๊ บอนกาวี เฟือกกะลา มันโทป้าด
ลักษณะ ไม้ล้มลุก มีเหง้าทودไปตามพื้นดิน ลำต้นตั้งตรงและอวบน้ำ มี

ความสูงได้ถึง ๒ เมตร ใบเดี่ยวรูปหัวใจกว้างแกมรูปไข่ ปลายใบมน
แผลมโคนเว้าลึกเป็นติงหู ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ
ก้านใบเรียวยาวอวบน้ำสีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบใน
ดอกแบบเชิงลดที่เรียกว่า สแพดิก และมีการห่อหุ้มช่อดอก ก้านชู
ช่อดอกขนาดใหญ่ ดอยอยู่ข้างเด็กสีขาวนวล ผลเป็นผลสดรูปไข่
กลับ เมล็ดทรงกลมสีดำ



กระดาดทั้ง ๒ ไม้ลงหัว มี ๒ ชนิด คือ กระดาดแดง กระดาดขาว

หัว รสเผาชื่น สรรพคุณ หุงกับน้ำมันใส่แล้ว กัดผ้าแล้ว กัดหนอง แก้เรื้อรัง รับประทานแก้เลา
ดานในท้อง และกัดเมือกมันในท้องได้ดีอีกด้วย

กระเตไ泰ไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Drynaria quercifolia* (L.) J.Sm.

ชื่อวงศ์ POLYPODIACEAE

ชื่ออื่น กระเตไ泰ไม้ (ภาคกลาง) กระพรอก (จันทบุรี) กระปอกรว่า (ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี) ฤดู
ขาออก เช้าวะนะ พุดคงแคะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เดาน์กาโล (มาเลย์-ปัตตานี) ใบหูช้าง
สไบนาง (กาญจนบุรี) สะโมง (ส่วน-สุรินทร์) หัวว่าว (ประจวบคีรีขันธ์)

ลักษณะ เพิรนอิงอาศัย เหง้าทอดイヤว มีเกล็ดสีน้ำตาลเข้ม เกล็ดแคบ ใบเดี่ยว มีรูปร่างและหน้าที่
ต่างกัน ๒ แบบ ใบไม่สร้างอับสปอร์เป็นรูปไข่ ปลายแหลม โคนมน ขอบหยักเว้ามันตื้นๆ
เข้าหาสันกลางใบทั้ง ๒ ด้าน ไม่มีก้านใบ ใบสร้างอับสปอร์รูปคล้ายใบประกอบแบบขนนก
ขอบหยักเว้าลึกเข้าหาสันกลางใบทั้ง ๒ ด้าน แต่ละหยักลึกเกือบถึงสันกลางใบ สันใบเป็น
ร่องแท่ กลุ่มอับสปอร์รูปกลมหรือรูปไข่ เรียงตัวค่อนข้างมีระเบียบ ๒ ข้างของสันใบที่แบ่ง
กลางแท่ละแยก

กระเตไ泰ไม้ ลักษณะคล้ายกลวยไม้ เกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ๆ
หัว รสจืดเบื่อเล็กน้อย สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้นิ้ว
แก้เบาหวาน เป้อพยาธิ แก้ไตพิการ แก้แพลงพุพอง





กะทือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zingiber zerumbet* (L.) Smith.

ชื่อวงศ์ *Zingiberaceae*

ชื่ออื่น กระทือป่า กระแวน กระแวน แสมดำ แหวดា เสียดา (ภาคเหนือ) เอียวแดง (แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะ ไม้ล้มลุก ลำต้นเหนือดินกลม มีเหง้าใต้ดิน ต้นโกรมในหน้าแล้งแล้วออกขึ้นใหม่ในหน้าฝน

ใบเดี่ยวออกเรียงสลับในรากน้ำเดียว ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อแท่งออกจากเหง้าขึ้นมา

แผ่นใบเรียบ สีเขียว ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อแท่งออกจากเหง้าขึ้นมา

ช่อดอกรูปทรงกระบอก มีใบประดับสีเขียวแกมแดง เรียงซ้อนกันแน่นเป็นระเบียบ ดอกสี

เหลือง โคนเขื่อมติดกันเป็นหลอด ดอกบานไม่พร้อมกัน ผล แบบผลแห้งแตก รูปทรงค่อนข้าง

กลม สีแดง เมล็ดสีดำ

กะทือ ไม้ลงหัวจำพวกขิง

กระทือป่า ดอกเขียว ใช้ทำยาได้ดีกว่า กระทือหยวก(กระทือบ้าน) ดอกแดง ดอกใหญ่ รับประทานได้

หัว เหง้า รสมะขีนน้อยๆ สรรพคุณ บำรุงน้ำนมสตรีให้บริบูรณ์ แก้ปวดมวนในท้อง แก้บิด

ขับผายลม ขับปัสสาวะ หัวกะทือหมกไฟ Fenugreek รับประทานแก้ปวดเบง แก้เสมหะ

เป็นพิษ แก้แน่นหน้าอက กล่อมอาเจม ขับน้ำย่อยอาหารให้ลงลำไส้

ราก รสมะขีนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ไข้ตัวเย็น แตรุสีกร้อนภายใน

ต้น รสมะขีน สรรพคุณ แก้เบื้องอาหาร ทำให้เจริญอาหาร

ใบ รสมะขีนเล็กน้อย สรรพคุณ ขับเลือดเน่าในมดลูก และขับน้ำคาวปลาหลังคลอดบุตรใหม่ๆ

ดอก รสมะขีน สรรพคุณ แก้ไข้เรื้อรัง ใช้จับสั้นผอมเหลือง แก้ไข้ตัวเย็น





กะทือป่า



กะทือป่า ไม้ลังหัว

หัว เหง้า รสมุขชื่นเล็กน้อย สรรพคุณ บำรุงน้ำนมสตรีให้บริบูรณ์ แก้ปวดมวนในท้อง แก้อบด (แบบไม่มีตัว) ขับผายลม ขับปัสสาวะ หัวกะทือหมกไฟฝนกับน้ำปูนใส รับประทาน แก้ปวด เป็น แก้อบด แก้เสมอเป็นพิษ แก้แน่นหน้าอก กล่อมอาเจم ขับน้ำย่อยอาหารให้ลงลำไส้ ราก รสมุขชื่นน้อยๆ สรรพคุณ แก้ไข้ตัวเย็น แต่ร้อนใน

กระเทียม



กระเทียม ไม้ลังหัวต้นเล็ก

หัว รสร้อนฉุน สรรพคุณ ใช้กระเทียมดิบ แก้อิโ แก้โรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน แพลงเน่า เนื้อร้าย บำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประจำทาง น้ำคันจากหัว หยดหู แก้ปวดหูและหูอื้อ



กลอย



กลอย ไม่ลงหัว มีสองชนิด คือ กลอยข้าวเหนียว(สีเหลือง) กลอยข้าวเจ้า(สีขาว) หัวกลอยจะคันมาก ให้ใช้ใบต่ำลีงกับข้าวเจ้าตำพอกแก้คัน
หัว รสนิ่นคัน สรรพคุณ กัดเคடานเป็นก้อนแข็งอยู่ในห้อง หุงกับน้ำมันทาแล้ว กัดหนองและผ้า

หัวกลอย หัวอุตพิษ หัวกระดาษ มีสรรพคุณคล้ายกัน

- * ป้องกันไม่ให้มีอาการเมาน้ำจากกลอย ใช้รังจีดแก้ได้หลังจากรับประทานกลอยเสร็จ หรือต้มกับข่อยคำอ้อยแดง
- * นำกลอยมาปลอกเปลือก ใส่เกลือ ใส่กระสอบแล้วนำไปที่น้ำไฟลประมาณ ๓-๑๐วัน หรือนำมาปลอกเปลือกออกลีกๆ นำมาใส่น้ำเกลือหมักไว้๒-๓คืน แล้วล้างเข้า-เย็น ประมาณ ๕วัน จนหอมแล้วใส่ผ้าดิบทับน้ำให้แห้ง สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ลดพิษของกลอย

กระวน



กระวน ไม่มีเหง้าหรือหน่อคล้ายข่า มี ๒ ชนิด คือชนิดขาว และชนิดดำ สรรพคุณเหมือนกัน ตระกูลเดียวกับอบเชย
ใบ รสเผ็ดเล็กน้อยกลิ่นหอม สรรพคุณ ขับลมให้ผายเรอ ขับเสมหะ แก้ไข้เชื่องซึม ดอกร รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ต้าเจ็บ ตาแฉะ ตามัว ถูก รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ ขับเสมหะ โลหิต และลม



ขมิ้นชัน



ขมิ้นชัน ไม้ลังหัว ขมิ้นชันโบราณ หัวจะมีสีแสดแดง ออกรสชาติมาก

หัว รสเผ็ดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้เพ้อดี คลึงเพ้อ แก้ไข้เรื้อรัง痛เหลือง แก้โรคผิวหนัง
แก้สิวะและโลหิต แก้ท้องร่วง สมานแผล รักษากระเพาะอาหาร แก้ปวดข้อ รักษาแผล
เบาหวาน (ผสมเกลือ น้ำมันมะพร้าว)

ขมิ้นอ้อย



ขมิ้นอ้อย (ขมิ้นหัวขี้น) ไม้ลังหัว

หัว รสเผ็ดเผื่อน สรรพคุณ แก้ครั้นเนื้อครั้นตัว สมานลำไส้ แก้ริดสูง ขับปัสสาวะ
ต้มออก แก้ฟกบวม อักเสบ แก้ไข้ คลายเส้นเอ็น(สรรพคุณคล้ายว่านเหลือง) แก้เข่าบวม
(นำมาทำกับเหล้าพอกทิ้งไว้ประมาณ ๓วัน) มักใช้เข้ายาต้มประมาณ ๓-๕ แวย่
ใบ รสเผื่อน สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้บวมช้ำ



ຂ່າໄຫວ່ງ (ຂ່າຫລວງ)

ข่าใหญ่ (ข่าวลวง ข่าว偽) เป็นพีซลงหัวจำพวกกระวน โคนตันข่าว

เหง้า หัว رسلผึ้ดร้อนชม สรรพคุณ แก้ปวดท้อง แก้จุกเสียดแน่น ขับลมให้กระจาย แก้ฟกบวม
แก้พิษ แก้ปิดตกโลหิต แก้ลมป่วง แก้เกลือน แก้สันนิบาตหน้าเพลิง ตำผสมกับเกลือ
มะขามเปียกให้สตรีคลอดใหม่ ๆ รับประทานขับเลือด ขับน้ำคาวปลา
ใบ رسلผึ้ดร้อน สรรพคุณ ฟ่าพยาธิ กลาก ต้มน้ำอาบ แก้ปวดเมื่อยตามข้อ
ดูก رسلผึ้ดร้อน สรรพคุณ ทาแก้เกลือน กลาก

ຜລ ຮລເຟີ້ດຣ້ອນຊຸນ ສຮຽນພຄຸນ ປ່າຍຍ່ອຍອາຫານ ແກ້ປວດທ້ອງ ຄລື່ນເທິ່ນ ອາເຈີ່ນ ທ້ອງອົດເຟ້ວ
ແກບຝຶມມີຕັວແລະ ໂມ່ມີຕັວ

ต้นอ่อน (หน่อ) รสเผ็ดร้อนหวานเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ล้มเน่นหน้าอก บำรุงเตาธาตุ ช่วยย่อยอาหาร

ຕັ້ນແກ່ ຮສເຜີດຮ້ອນໜ້າ ສຽງຄຸມ ຕຳພົມນັ້ນມັນມະພ້າວ ທາເກັປວດເມື່ອຕາມກລັມເນື້ອ¹
ແກ້ປວດຂ້ອງ ແກ້ລົມຕະຄຣິວ

راك รслເຟັດຮອນປ່ວ່າ ສຮຣພຄຸນ ແກ້ໄລ້ອດເດືອນໄມ່ສະດວກ ແກ້ໜັນບໍ່ຈາ ແກ້ໜັນບໍ່ຈາ ແກ້ໜັນບໍ່ຈາ ແລະ ໂລທິຕ



ข่าตาแดง



ข่าตาแดง ลักษณะเหมือนข่าใหญ่ แต่เล็กกว่าเล็กน้อย โคนตันสีแดง หน่อขี้นใหม่แดง รสจัดกว่าข่าหลวง
เหง้า หัว รสเผ็ดร้อนชม สรรพคุณ แก้ปวดท้อง แก้จุกเสียดแน่น ขับลมให้กระหาย
แก้ฟกบวม แก้พิษ แก้บิดตกลอหิต แก้ลมป่วง แก้เกลื่อน แก้สันนิบาตหน้าเพลิง ตำผสมกับ
เกลือมะขามเปียกให้สตรีคลอดใหม่ ๆ รับประทานขับเลือด ขับน้ำคาวปลา
ใบ รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ ฆ่าตัวพยาธิกาก ต้มน้ำอาบ แก้ปวดเมื่อยตามข้อ
ดอก รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ ทาแก้เกลื่อน กาก
ผล รสเผ็ดร้อนฉุน สรรพคุณ ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดท้อง คลื่นเหียน อาเจียน ท้องอืดเฟ้อ
แก็บดมมีตัวและไม่มีตัว
ต้นอ่อน (หน่อ) รสเผ็ดร้อนหวานน้อย ๆ สรรพคุณ แก้ลมแน่นหน้าอก บำรุงเตorchat
ช่วยย่อยอาหาร

ข่าลิง (ข่าเล็ก, ข่าน้อย)



ข่าลิง (ข่าเล็ก, ข่าน้อย) ลักษณะเหมือนข่าใหญ่ทุกประการแต่เล็กกว่าเท่าตัว
หัว เหง้า รสเผ็ดร้อนช่า สรรพคุณ แก้กามโรค แก้จุกเสียด แน่นเพ้อ
ต้น รสเผ็ดร้อนช่า สรรพคุณ แก้ฝีดาษ ฝีทราย ฝีเส้น ฝีฝกบัว
ใบ รสเผ็ดร้อนช่า สรรพคุณ แก้เกลื่อนน้อยใหญ่ ฆ่าพยาธิ
ดอก ผล รสเผ็ดร้อนช่า สรรพคุณ ขับพยาธิลำไส้ ฆ่าพยาธิภายในอก
ราก รสเผ็ดร้อนหอม สรรพคุณ แก้พิษฝีภายนอก- ภายนอก



ข้าวเย็นใต้



ข้าวเย็นใต้ (ข้าวเย็นไทย) ไม้เลื้อยลงหัวชนิดนี้ เนื้อในหัว สีขาว

หัวและราก รสกร่อยหวานมันเล็กน้อย สรรพคุณ แก้กามโรค น้ำเหลืองเสียพุพอง ขับปัสสาวะ
ใบ รลชื่น สรรพคุณ แก้ปากบworm อักเสบ
ดอก รลชื่นเบื้อง สรรพคุณ แก้โรคผิวนัง แก้คุดทะราด
ผล รลชื่น สรรพคุณ ลงไฟนาบลูกอัณฑะ แก้อัณฑะอุ้ง (ไส้เลื่อน)

ข้าวเย็นเหนือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Smylax peggiana*

ชื่อวงศ์ LILIACEAE

ลักษณะ ข้าวเย็นเหนืออยู่คู่กับข้าวเย็นใต้ เป็นไม้เลื้อยลงหัว ลำต้นมีหนาม ใบคล้ายใบกลอย หัวสี
น้ำตาลอ่อน

สรรพคุณ ใช้หัวแก้สันพิการ น้ำเหลืองเสีย กามโรค ฝีเปื้อย พุพอง และต้นแก้อมพาต



ขิงแคลง



ขิงแคลง (ขิงป่า) ไม้ลังหัวหรือลงแรง แต่เล็กกว่าขิงบ้าน

เหง้า รสหวานเผ็ดร้อนชม สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อลม แก้ลมพรดีก แก้ลมพานไส้ แก้แน่น
แก้เสียดแหง แก้นอนไม่หลับ แก้คลีนเทียนอาเจียน

ขิงบ้าน



ขิงบ้าน ไม้ลังหัวจำพวกเป็นแรง หรือเหง้า

เหง้า รสหวานเผ็ดร้อน สรรพคุณ ขับลม แก้ปวดท้อง แก้จุกเสียด เจริญอาหารชาตุ
ตัน รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ ขับลมให้ผายเรอ
ใบ รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ บำรุงกำเดา
ดอก รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ แก้โรคประสาท ชี้่ทำให้หัวใจชุ่นมัว
ราก รสหวานเผ็ดร้อน สรรพคุณ ขับเสมหะในลำคอ เจริญอาหาร




เข้าค่า

เข้าค่า ไม้ต้นลงหัว ต้นกรอบๆ ปัจจุบันสูญพันธุ์แล้ว

หัว รสร้อน สรรพคุณ แก้ฟกบวม แก้พยาธิ แก้คุดทะลاد
ยาง รสร้อนจัด สรรพคุณ กัดน้ำลาย แต่เป็นพิษต่อร่างกาย

คลุ่ม



คลุ่ม ไม้ลงหัวหรือเหง้า คลุ่มต้นใหญ่ ใบหนา หัวสีแดง/คล้ำตันเล็ก คลุ่ม กระดูกใบจะเป็นร่องลึก

แต่คล้าใบมันจะเรียบกว่า

หัว รสเย็นเบื่อ สรรพคุณ แก้ไข้สูง ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้พิษไข้ตัวร้อน (ลดความร้อน)

แก้ไข้เหนือย แก้ปอดบวม แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้รากสาด แก้ไข้หัด สุกใส ดำเนง ฝีดาษ



၆



คุณ ไม่ลงหัว ต้นคล้ายบอน มีสองพันธุ์ คือ ต้นเล็กมีสีเหลือง / กับต้นใหญ่(หัวจะคันกว่าต้นเล็ก)

หัว رسلເຜີດຂຶ້ນຄັນ ສຽງພົມ ແກ້ກ້ອນເຄາດານໃນທົ່ວໆ ສຸມເປັນເຄາຄ່າໆນຳສະຍາ ແກ້ພິບໄຟຕ້ວ້ຮຸນ
ແກ້ໄຟເຊື່ອງໜົມ ແກ້ພິບຕານຫາງເຕີກ ມູງກັບນໍ້າມັນທາບາດແພລ ກັດຝ້າ ກັດໜອນໄດ້ດີ

ง่อนตามราย



ง่อนตากหงาย ไม้ตันขนาดเล็กๆ ลงหัว

หัว รสเย็น สรรพคุณ ถอนพิษของเบื้องมา ถอนพิษไข้ตัวร้อน ไข้จับสั่น

ດອງດີ່ງ



คงดีง ไม่เคยเลือยขนาดเล็กลงหัว

หัว รสร้อนมา สรรพคุณ แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้ป่วยข้อ (รูมาติซัม) แก้กามโรค
แก้พิษสัตว์กดต่อย ขับพยาลน เข้ายาแก้ริดสีดวงทวาร



เต่าเกียด



เต่าเกียด ไม่พุ่งลงหัว มีเต่าเกียดเขียว กับ เต่าเกียดแดง
หัว รสเย็นหอมฉุน สรรพคุณ แก้ตับ ปอดพิการ กัดฟอกเสมหะ แก้อิโ ทำให้คัน

ถั่วพู



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Psophocarpus tetragonolobus* (L.) DC.

ชื่อวงศ์ FABACEAE

ชื่อสามัญ Winged bean

ถั่วพู ไม้เลื้อยชนิดลงหัว นิยมใช้ของไทย จะเป็นพืชแบบฯ

หัว รสหวานชุ่ม สรรพคุณ ชูกำลัง บำรุงครรภ์ แก้อ่อนเพลีย บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น แก้瘴เด็ก



ท้าวยายม่อม (หัว)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tacca leontopetaloides* (L.) Kuntze

ชื่อวงศ์ Taccaceae

ชื่ออื่น ไม้เท้าຖaise (ภาคกลาง) สิงโตคำ (กรุงเทพฯ) บุกรอ (ตราด)

ท้าวยายม่อม ไม้ชนิดลงหัว

หัว ทำเป็นเรียกว่า แปงท้าวยายม่อม รสมัน สรรพคุณ ผสมน้ำตาลกรวดให้คนเข้ารับประทาน
บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ ทำให้จิตใจชุ่มชื่น เข้ายาตำรับ แก้ปอดข้อ

ท้าวยายม่อม (ต้น)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clerodendrum petasites* (Lour.) S.Moore

ชื่อวงศ์ Labiateae

ชื่ออื่น กากะลอง จุดพระธรณี ดอกคาน (ยะลา) ท้าวยายม่อมป่า (อุยลราชธานี) ปี้งxm ปี้งหลวง

(ภาคเหนือ) พญาракเดียว (ภาคใต้) พญาเลึงจ้อน เลึงจ้อนใต้ (เชียงใหม่) พมพี (อุดรธานี)

พวงกอ (กะเหรี่ยง-กำแพงเพชร) พินที (เลย) โพพิ่ง (ราชบุรี) ไม้เท้าຖaise (ภาคเหนือ, ภาคใต้)

หญ้าลินจ้อน (ประจำบคีรีขันร)



บุก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Amorphophallus campanulatus* Bl.ex Dence.

(*A.paeonifolius* (Dennst.) Nicolson

ชื่อวงศ์ ARACEAE

ชื่อสามัญ Elephant yam, Stanley's water-tub

ชื่ออื่น บุกคุงคง (ชลบุรี) เปีย เปือ (แม่ฮ่องสอน) มันชูรัน (ภาคกลาง) หัวบุก (ปัตตานี) บุกคงคง (ภาคกลาง, เชียงใหม่) บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน)

บุก ไม้ล้มลุกลงหัว

หัว รสเบื่อเม่าคัน สรรพคุณ กัดเตาดาน กัดเสมอ หุงกับน้ำมันทาแลกัดผ้า กัดหนอง

* หัวบุกมีสารสำคัญ คือกลูโคเมนแนน เป็นสารประเภท คาร์บอไฮเดรท ซึ่งประกอบด้วย กลูโคลส แม่นโนนส และฟลูค็อตส กลูโคเมนแนน สามารถลดปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ ก็เนื่องจากความเห็นี่ยว ซึ่งยังบ่งการดูดซึมของกลูโคลสจากทางเดินอาหาร ยิ่งหนึ่งมาก็ยิ่งมีผลลดการดูดซึมกลูโคลส ตั้งนั้น กลูโคเมนแนน ซึ่งเห็นี่กว่า ๔ua ๔pm จึงลดน้ำตาลได้ดีกว่า ซึ่งใช้เป็นวุ้นเป็นอาหารสำหรับ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมีไขมันในเลือดสูง



บัวน้ำ บัวสาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn.

ชื่อวงศ์ NYMPHAEACEAE

ชื่อสามัญ Water Lily

ชื่ออื่น ดอกบัว

บัวน้ำ บัวสาย อันที่จริงจำพวกบัวน้ำหรือบัวสายนี้ เป็นพืชประเภทที่อยู่ในน้ำ มีหัวและเหง้าด้วย ก็เลย
เอามาอธิบายไว้ในพืชจำพวกนี้ด้วย คือ

๑. บัวซุ่มสายสายเล็กพันธุ์ดอกขาว



๒. บัวกินสายสายขนาดเล็กพันธุ์ดอกขาวแ甘มชมพู



๓. บัวสัตตบุษย์สายใหญ่พันธุ์ดอกขาวปลodor



๔. บัวสัตตบุรณสายใหญ่พันธุ์ดอกสีแดงหรือสีชมพู



๕. บัวจงกลนีสายใหญ่พันธุ์ดอกสีชมพูอ่อน



๖. บัวเพื่อนสายขนาดกลางพันธุ์ดอกสีซีดขาว



๗. บัวผันสายเล็กพันธุ์ดอกสีราม ถ้าดอกสีม่วงหรือสีชมพูสายและดอกจะใหญ่



บัวทั้งหมดนี้ มีสรรพคุณเหมือนกันคือ

ดอก รสมากห้อมเย็น สรรพคุณ บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น บำรุงกำลัง แก้ไข้ตัวร้อน
เมล็ด (คั่ว) รสมหอม สรรพคุณ บำรุงกำลัง เจริญอาหาร
หัว รสมเบื้องมเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง บำรุงราก อาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ แก้
ปวดเมื่อยตามร่างกาย



ปรงบ້ານ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cycas circinalis* L.

ชื่อวงศ์ Cycadaceae

ชื่ออื่น กາ กາเดາ ກູດໜລວາ ແຂ່ງ ທອຄລີ ບອກະ ມະພ້າວເຕົ່າໂດຍ ມະພ້າວເຕົ່າຫລວງ ມຸ່ງມາງ

ปรงບ້ານ (ปรงນ້ຳຈຶດ) ໄນມຸ່ມລັງທ້ວ

ທ້ວ ຮສເຢັນເປື່ອ ສຮຽພຄຸນ ຝົນກັບນໍ້າປຸນໃສທາ ແກ້ລຳລາບເພີງ ພູສວັດ ເຮີມ ດັບພິບປະດແສບ
ປວດຮອນ

ปรงປໍາ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cycas siamensis* Miq.

ชื่อวงศ์ CYCADACEAE

ชื่ออื่น ຕາລປັກຄາມີ ປົງເຫຼື່ມ ພັກກູດບກ ໂກໂລໂຄດີ ຕາຜູຈືອດີ

ปรงປໍາ ໄນລັງທ້ວໃໝ່

ທ້ວ ຮສໄຟເຢັນ ສຮຽພຄຸນ ຝົນກັບສຸຮາທາ ແກ້ຟກບວມ ສມານແພດ ແກ້ຟເພລເຮື້ອຮັງ ແພລກລາຍ
ດອກ ຮສເຜີດ ສຮຽພຄຸນ ບຳຮຸງຮ່າຍກາຍ ບຳຮຸງຮາຕຸ ແກ້ລົມ ແກ້ດີແລະເສມ໌ທະພິການ



-pane-pa



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Kaempferia marginata* Carey

ชื่อวงศ์ Zingiberaceae

ชื่ออื่น ตูบหมูบ (อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ); เปราะเลื่อน (ปราจีนบุรี ชพ); เประขา เประปา

เประปา ไม้ลงหัว

หัว รสเผ็ดขมจัด สรรพคุณ แก้ไข้ แก้หวัด แก้กำเดา ขับลมในลำไส้ ตำสุมศีรษะเด็ก
แก้หวัดกำเดา

-pane-hom-xaw



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Kaempferia galanga* L.

ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE

ชื่อสามัญ Sand Ginger, Aromatic Ginger, Resurrection Lily

ชื่ออื่น หอมเปราะ (ภาคกลาง) ว่านตีนดิน ว่านแแห่นดินเย็น ว่านหอม (ภาคเหนือ)

เประathomxaw ไม้ลงหัวชนิดเดียวกับเประathomแดง

หัว ใบ รากร้อนหอม สรรพคุณ ขับลมในลำไส้ให้ผายเรอ แก้ท้องเสื้อ อีดเพ้อ สูมกระหม่อม
เด็ก แก้หวัด กำเดา ชางซัก และลมชาง

ต้น รสหอมติดร้อน สรรพคุณ ขับเลือดเน่าของสตรีหลังคลอดบุตร

ดอก รสหอมฉุน สรรพคุณ แก้เด็กนอนสะดึงผวา ร้องไห้ตาก้าง ชาตาเหลือก



ประทอมแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Kaempferia galanga* L.

ชื่อสามัญ Sand Ginger, Aromatic Ginger, Resurrection Lily

ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่น ห้อมเปราะ (ภาคกลาง) ว่านตีนดิน ว่านแผ่นดินเย็น ว่านห้อม (ภาคเหนือ)

ประทอมแดง ไม้ลังหัวจำพวกมหาพร

หัว รสห้อมเผ็ดเล็กน้อย สรรพคุณ ขับเลือด ขับหนองให้ตก แก้ไอ แก้ลมพิษ แก้ผื่นคัน
ต้น รสห้อมเผ็ดเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ห้องอืดขึ้นไฟฟ้อ^ก
ใบ รสร้อนกลิ่นห้อม สรรพคุณ แก้เกลี้องวงใหญ่
ดอก รสห้อมติดร้อน สรรพคุณ แก้โรคตาอักเสบ ตาแฉะ

พุทธรักษากาดออกแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Canna* spp. and hybrid

ชื่อวงศ์ Cannaceae

ชื่อสามัญ Indian shot

ชื่อพื้นเมือง พุทธศร ดอกบัวลาวงศ์

พุทธรักษากาดออกแดง ไม้ลังลูกลงหัว

หัว รสเย็นชื่น สรรพคุณ บำรุงปอด แก้อาเจียนและไอเป็นໂລທິຕ ຮັກษาอาการของตັບ



ไฟล



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zingiber montanum* (Koenig) Link ex Dietr./*Z.purpureum* Roscoe

ชื่อวงศ์ *Zingiberaceae*

ชื่ออื่น ปุโลย ปุเลย พันเลย ปันเลย (ภาคเหนือ) ว่านไฟ (ภาคกลาง) ปุขมีน มีนสะล่าง (ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน) ว่านป้อม(ภาคอีสาน)

ไฟล ไม้ลงหัว

หัว รสมذاดขี้นอุ่น สรรพคุณ ตำคนสมสมกับเกลือสะตุ ๑ ช้อนโต๊ะรับประทานถ่ายพิษบิด ขับลมในลำไส้ ขับประจำเดือนสตรี(ไม่ควรใช้นานเกินสองเดือน) ขับเลือดเสีย ขับน้ำคาวปลา(ควรรับประทานประมาณ ๓ วัน) ผนทากแก้เคล็ดบวมยก และผสมกับน้ำมันเบนซิน ทาแก้เห็บบ ชาชนิดบวม สมานแผล ไม่ควรใช้ในสตรีที่ให้นมบุตร รับประทานมากจะทำให้เลือดแห้ง ขับลมในเส้นเอ็นได้ ไม่นิยมใช้รับประทาน จะนิยมใช้ประกอบมากกว่าในผู้ป่วยกลุ่มอาการ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

ใบ รสมcheinอุ่น สรรพคุณ แก้ครั้นเนื้อครั้นตัว แก้ปวดเมื่อย
ต้น รสมذاดขี้นอุ่น สรรพคุณ แก้อุจาระพิการ แก้ร้าตุพิการ อุจาระพิการ แก้ร้าตุพิการ

ดอก รสมcheinอุ่น สรรพคุณ แก้เลือดกำเดาออกทางปากทางจมูก แก้อาเจียนเป็นโลหิต
ราก รสมcheinอุ่น สรรพคุณ แก้เลือดกำเดาอออกทางปากทางจมูก แก้อาเจียนเป็นโลหิต



มหากาพ (ว่านมหากาพ)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gynura pseudochina* (L.) DC.

ชื่อวงศ์ Asteraceae (Compositae)

ชื่ออื่น ดาวเรือง (ภาคกลาง) ผักกาดกบ (เพชรบูรณ์) ผักกาดนกเขา (สุราษฎร์ธานี)

คำโคล (ขอนแก่น-เลย) หนادแห้ง (นครราชสีมา)

มหากาพ (ว่านมหากาพ) ไม้ล่งหัว หัวมีสีขาว

หัว รสเย็น สรรพคุณ ตับพิษกาพ ตับพิษร้อน แก้พิษไข้เชื้อชื้ม แก้กระสับกระส่าย

แก้พิษอักเสบ

ใบ รสเย็น สรรพคุณ ทำพอกถอนพิษฝี แก้อักเสบ ปวดแสบปวดร้อน



มหาสแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *C. gigantea* (Wall. ex Hook)/*C. glaba* ; *Alsophila gigantea* Wall. ex Hook.

ชื่ออื่น กุดโง่ หางนกยูง (ภาคเหนือ) คาซูโด (กะเหรี่ยง) มหาสดำ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) กุดโยง(ภาคกลาง)

มหาสแดง (ภาคใต้) ว่านไก่น้อย ละองไฟฟ้า โพสี (ปัตตานี) นิโพสี (สงขลา ยะลา) แตตดลิง (ตราด)

ชนไก่น้อย (เลย) กุดเสือ กุดพาน (เหนือ) กุดผีป่า

ลักษณะ ลำต้นตั้งตรงสูง ๔-๗ เมตร มีเกล็ดปกคุณ และมีรอยก้านใบที่หลุดร่วงไป راكเป็นสันแข็งสีดำ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นถึงสามชั้น ออกเป็นกลุ่มบริเวณปลายยอด ก้านใบสีน้ำตาลอ่อนม่วงหรือสีน้ำตาลดำเป็นมันวาว ยาวประมาณ ๕๐ ซม. หรือมากกว่า มีร่องตามยาว โคนมีเกล็ดสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเป็นมัน กว้างประมาณ ๒ มม. ยาวประมาณ ๑.๗ ซม. แกนกลางใบประกอบมีสีเข้มเดียวกับก้านใบ มีร่องตามยาวและมีขัน แผ่นใบกว้างประมาณ ๖๕ ซม. ยาวประมาณ ๒.๖ เมตร ใบย่อย ๘-๑๓ คู่ ใบย่อยชั้นที่ ๒ มีก้านใบสั้น แผ่นใบรูปขอบขนานแกรมรูปใบหอก สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ ๑.๗-๒ ซม. ยาวประมาณ ๙.๕-๑๒ ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบหยักเว้าเข้าหากันในจุดยอด ผิวใบเรียบเกลี้ยง เส้นกลางใบย่อยมีเกล็ดปกคุณประปราย เส้นใบแยกแตกแขนงเป็น ๕ คู่ในแต่ละหยักมองเห็นได้ชัดทั้งสองด้าน กลุ่มอับสปอร์เรียงตัวเป็นรูปคล้ายตัววีคำว่าอยู่บนเส้นใบย่อยที่ไม่มีเกล็ดปกคุณ ไม่มีเยื่อคุณอับสปอร์

มหาสแดง ไม้กอลงหัว อุยตระกูลเดียวกับว่านกีบแรก มีขัน ขึ้นตามหน้าผา ที่สูง ที่ชุมชน

หัว ชน รสเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ แก้พิษร้อน แก้พิษหัวใจ แก้ตัวร้อน ขับปัสสาวะ



มหาสต์

ชื่อวิทยาศาสตร์ *C. podophylla* (Hk.) Copel.

ชื่ออื่น กุดตัน

ลักษณะ ลำต้นขนาดเล็กและสูงราก ๑-๒ เมตร ใบประกอบสีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาลอ่อนแดง และมี
หนามสั้นๆปกคลุม โคนใบย่อยไม่แหลม ขอบใบเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ เส้นใบแยกใกล้
ขอบใบ หลังใบมีขนอ่อนนุ่มปกคลุม ห้องใบมีเกล็ดยาวสีน้ำตาล อับสปอร์มีเกล็ดขนาดเล็ก
แทบมองไม่เห็นปกคลุมอยู่



๓๑๕

ยัง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Smilax ovalifolia* Roxb.

ชื่อวงศ์ Smilacaceae

ชื่ออื่น เจียมย่างกอง(เมียน), เครือเดา(ขมุ, คนเมือง), ด่องบ้าย(ປະຫລຸ່ອງ)

ยัง ไม้เถาเลื้อยลงหัว

หัว รสหวานเล็กน้อย สรรพคุณ ดับพิษ แก้เส้นเอ็นพิการ แก้กำโรค น้ำเหลืองเสีย
เข้าข้อ

* ในรูปเป็นหัวยังโล้น เป็นวัชพีชปกคุณดิน ไม่มีหานาม

มียังโล้น ยังเล็ก(ไม่มีหานาม) ยังเกาใหญ่(มีหานาม) ยังแดงมีเมือ ยังเขียวไม่มีเมือ

เร็ดหนู



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Stachyphrynium jagorianum*(K. Koch.) K. Schum.

ชื่อวงศ์ MARANTACEAE

ชื่ออื่น แหรดหนู, เร็ดหนู(สงขลา), กากแล็ตกาเว้า, การีดกาเหว่า(สุราษฎร์ธานี)

เร็ดหนู ไม้ต้นเล็กๆ ลงหัว ขึ้นในป่าชื้น หัวขนาดเล็ก

หัว ราก รสร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้อ่อนเพลีย แก้กำตาดด้าน ขับ
ปัสสาวะ



ล้ำพันแดง และ ล้ำพันขาว

ล้ำพันแดง และ ล้ำพันขาว ไม่จำพวกเหง้า ลักษณะคล้ายต้นว่านหาง ในลักษณะเดียวกันนี้ ใบเล็กเรียวยาว ขอบขานานปลายแหลม ล้ำพันแดงต้นสีแดง ล้ำพันขาวต้นสีขาว เหง้าขนาดเท่านิ้ว葵อยกลมงอไปมา เกิดตามป่าชายเลนริมทะเล

เหง้า รสเค็มกร่อยร้อน สรรพคุณ ขับโลหิตระดูสตรี ขับลมลำไส้ แก้จุกเสียด แก้โลหิตระดู ทำพิษให้คลั่งเพ้อ

ล้ำพันทางหมู



ล้ำพันทางหมู เป็นไม้จำพวกเหง้า ลักษณะคล้ายว่านหาง ในภาษาเรียกว่าบานานปลายแหลม เหง้าเปลือกสีดำ มีรากเป็นฝอยแข็งสีดำเหมือนทางหมู เกิดอยู่ตามป่าชายเลนริมทะเล
เหง้า รสเผ็ดเค็ม ขับโลหิตระดู ขับลมในลำไส้



หวานตะมอย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dendrobium crumenatum* (Rumph.) Sw.

ชื่อวงศ์ Epidendroideae

ชื่ออื่น เอื้องมะลิ หวานพระอินทร์ แส้พระอินทร์ บัวกลางหัว เที่ยมลิง ดอกไม้ไหว นกกระยาง

หวานตะมอย นกกระยาง

หวานตะมอย “ไม่ใช้มีลังหัว” (พวงกลัวย์ไม้)

ใบ รสมีน สรรพคุณ ต่ำพอกห้องเด็กทำให้ห้องร้อน แก้ปวดห้อง ต้มอาบแก้ชางซัก ฝนตกแก้
แมลงพุพอง

กาบก้านที่พองโต รสมีน สรรพคุณ แก้มือเท้าเย็น บำรุงหัวใจ ทำให้อิจฉารเด็นเร็ว แก้ไข้ก้าง
กระทุ้งพิษ ดับพิษร้อน ขับพยาธิ



สิงห์มีรา



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cyrtosperma Johnstoni* N.E.Br.

ชื่อวงศ์ ARACEAE

ชื่ออื่น ผักหนามผั่ง (กรุงเทพฯ) ว่านสิงห์มีรา (ไทย)

สิงห์มีรา ไม้กอลงเหง้า ลำต้นเป็นหนามสีแดง

เหง้า ก้าน ใบ รสมะร้อน สรรพคุณ บำรุงโลหิต ช่วยย่อยอาหาร ขับน้ำคาวปลาหลังคลอดบุตร
ดอก ก้านดอก สรรพคุณ แก้ริดสีดวงจมูก

เหง้า สรรพคุณ ใช้แก้มูกติกิต ระดูขาว

หัว สรรพคุณ แก้โรคตับ รักษาโรคเกี่ยวกับเลือด แก้ปวดหลัง แก้ปวดเมื่อย สามารถใช้เป็น
ยาเดี่ยวได้ ใช้ชงน้ำดื่ม

*ก่อนใช้ควรนำทุกส่วน มาทำให้แห้งก่อน เพราะยางจะทำให้คัน

โสมไทย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Talinum paniculatum* Gaertn.

ชื่อวงศ์ Portulacaceae

โสมไทย ไม้เลາลงหัว ใบอวบน้ำเป็นเมือก

หัว ราก รสมะมัน สรรพคุณ บำรุงกำลังให้แข็งแรงกระปรี้กระเปร่า บำรุงโลหิต

*ใบ นำมาทอడกับไข่ บำรุงตับ บำรุงหัวใจ



ອຸຕິພິດ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Typhonium trilobatum* Schott.

ชื่อวงศ์ ARACEAE

ชื่ออื่น มะโทรา (จันทบุรี) บอนแบ้ว (เชียงใหม่)

อุตพิด ไม้กอลงหัว

หัว رسلขึ้นคัน สรรพคุณ แก้ไอ ขับปัสสาวะ กัดล้างเสมหะ แก้ริดสีดิวงทวารหนัก

แก้ริดสีดวงจมูก แก้โรคท้องман แก้แพลเปื่อย เช่น แพลเปื่อยจากภัย

* แก้คันโดยใช้น้ำอ้อยแดง



ผักกระชับ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Xanthium strumarium* L.

ชื่อวงศ์ ASTERACEAE (COMPOSITAE)

ชื่อสามัญ Cocklebur

ชื่ออื่น กระชับ เกียงนา ขี้ครอก (ราชบุรี) ขี้อัน (ภาคเหนือ) ขี้อันดอน (ขอนแก่น เลย)

ลักษณะ ไม้ล้มลุกเป็นเดียว ลำต้นตรง สูงได้ถึง ๑.๕ ม. ใบเดียว เรียงสลับ รูปไข่-แกรมรูปสามเหลี่ยม โคน เว้าเล็กน้อย ขอบเรียบหรือหยักเว้าแห่งว่าง ช่อดอกออกตามจั่มใบ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย อยู่ในช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้เล็ก อยู่ชิดติดกันเป็นกระฉูกกลมตรงปลายช่อ ดอกเพศเมีย อยู่ชิดกันเป็นคู่ๆ ในกระเบาะกลมรี ทางตอนล่างของช่อ เปลือกมีห่านมาปลายอ่อนขอ ที่ปลายกระเบาะมีห่านมาแข็ง ๒ อันโคงอเข้าหากัน แต่ละกระเบาะมี ๒ ผล ผลละ ๑ เมล็ด เมล็ดแก่สีดำ

ผักกระชับ เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม (ซักบอเช้า)

ราก รสจืดเย็น สรรพคุณ ระงับความร้อน แก้ไข้ ขับปัสสาวะ

ผักกระเฉด



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Neptunia oleracea* Lour.

ชื่อวงศ์ Lecuminosae

ชื่อสามัญ Water mimosa

ชื่ออื่น ผักหนอง (ภาคเหนือ) ผักกระเฉด ผักรุ้นอ่อน (ภาคกลาง) ผักหลาหนอง (แม่ฮ่องสอน) ผัดฉี่ด (ใต้) ผักกระเศดน้ำ (อีสาน-อุดรธานี-ยโสธร)

ลักษณะ เป็นพืชน้ำล้มลุก เป็นເຄາเล້ອຍເສມອກับผົວນໍ້າ ลำต้นกลมສືເຊີຍ ตามປລ້ອງ ແກ່ຈະມືນວມສືຂາວໆ ຄລ້າຍກັບພອງນໍ້າທຸ່ມອູ່ ຈຶ່ງທຳໃຫ້ຜັກຜະເຮດລອຍນໍ້າໄດ້ ໃບເປັນ ໃບປະກອບແບບນັກອອກຕາມ ຂ້ອ ຄລ້າຍໃບມະໜາມ ໃບສືເຊີວຂອບໃບຈະເປັນສົມວ່ວງ ໃບຈະຫຸ່ນເວລາທີ່ໂດຍສັນພັສແລະຕອນກລາງຄື່ນ ຮາກຈະແຕກອອກເປັນກະຈຸກຕາມບຣິວັນຂ້ອ ຜັກຜະເຮດຈະອອກດອກເປັນຊ່ອກລົມສືເຫຼືອງຕາມ ທອກໃບ ລົດຈະອອກເປັນຝັກໂຄງໂລກນໍ້າ ມີເມັລືດດ້ານໃນ ๔-๑๐ ເມັລືດ

ຜັກຜະເຮດ (ຜັກຮູ້ນອນ) ເປັນໄມ້ເລື້ອຍ ມີ ๒ ສາຍພັນຮຸ ແບບບກກັບນໍ້າ

ໃບ ຮສເຢັນ ສරີພຸດ ແກ່ໃໝ່ຕ້ວ້ອນ ຕອນພິ່ນຍັກເສບ



ผักกระโฉบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Limnophila rugosa* Merr.

ชื่อวงศ์ SCROPHULARIACEAE

ชื่อสามัญ MARSH WEED

ชื่ออื่น ผักกะโสม อ้มกบ ผักกระโ奔波 ผักกระโฉบ ผักกะโสม ผักกะโสม อ้มกบ สุ่ยหุยเชียง



ลักษณะ ต้น ไม่ล้มลุกจำพวกหญ้าขนาดเล็กมีอายุหลายปี ลำต้นแทรกแขนงออกไปสัน้ำตาล omniphytic ลักษณะอ่อนน้ำ ต้นที่ยังเล็กอยู่มีข้อปักคลุมพอตหรือแก่นจะหลุดร่วงไป ลำต้นสูงประมาณ ๑๕-๒๐ ซม. มีก้านห้อมคล้ายลูกกระวน ในใบเดียวออกเป็นคู่ๆ ตรงข้ามกัน ใบเป็นรูปไข่ปลายมน (คล้ายใบโพธิ์) แต่ที่หลังใบจะมีข้อปักคลุมและเป็นรอยย่น ขนาดของใบกว้างประมาณ ๒.๕-๓ ซม. ยาว ๔-๖ ซม. สีเขียวจัด ก้านใบสั้น มีก้านห้อมคล้ายลูกกระวน ดอกออกเป็นช่ออยู่ต่างส่วนยอดของลำต้น ดอกสัน้ำเงินอมม่วงกลางดอกสีเหลือง ดอกคล้ายรูปปาก ด้านบนมี ๒ กลีบ ด้านล่าง ๓ กลีบ ดอกเล็กประมาณ ๘ มม. ไม่มีก้านดอก

ผักกระโ奔波

ใบ รสเย็น สรรพคุณ แก้ไข้พิษ ใช้ตัวร้อน ใช้หวัด แก้ปวดศีรษะ

ผักกาด(หัวไชเท้า)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Raphanus sativus* Linn., Cv group Chinese radish

ชื่อสามัญ Chinese radish, Oriental radish, Daikon

ชื่อวงศ์ Cruciferae

ชื่ออื่น ไชเท้า,หัวผักกาดขาว (หัวไป) ; ผักกาดจีน(ภาคกลาง) ; ผักขี้หูด, ผักเป็ดหัว(ภาคเหนือ) ; ไหล่อก, จีชั่ง (จีน)



ลักษณะ เป็นพืชจำพวกผัก มีรากสะสมอาหารลักษณะทรงกระบอกใหญ่ยิ่ง สีขาวหรือสีอ่อน ต้นสูงประมาณ ๑ เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบແಡกออกจากโคนต้นเป็นกอ ยาว ๑๒-๑๒ ซม. ตัวใบใหญ่ปลายใบมน ขอบใบมีรอยเว้าลึก ๔-๖ คูทั้ง ๒ ข้าง ขอบใบมีรอยหยักคล้ายฟัน ก้านใบลักษณะสามเหลี่ยม ขอบมนใบที่ออกจากต้นที่ชูสูงขึ้นจะมีขนาดเล็กลง ใบรูปไข่กว้าง ๑-๑.๕ ซม. ยาว ๓-๕ ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบมีรอยหยักตื้น ๆ หรือแทบไม่มีเลย โคนใบมีก้านสั้นๆ หรือแทบไม่มี ดอกออกเป็นช่อจากปลายก้านดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง ๔ กลีบ สีเขียวเป็นแผ่นยาวปลายมนกลม กลีบดอกมี ๔ กลีบ เป็นแผ่นยาวปลายมนกลมสีม่วงอ่อนหรือสีชมพู ส่วนโคนกลีบดอกสีขาว มีเกสรตัวผู้ ๔ อัน และเกสรตัวเมีย ๑ อัน รังไข่ลักษณะเป็นฝักยาวกลมผลเป็นฝักยาวมีเมล็ดเป็นจำนวนมาก เมล็ดกลม แบบเล็กน้อยมีสัน้ำตาล เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ มม.

ผักกาด (หัวไชเท้า)

หัว รสเผื่อนชุ่ม สรรพคุณ ทำคันกับน้ำตาลทรายแดง แก้อาเจียนเป็นโลหิต

เมล็ด รสเผ็ดสุขุม ขับเสมหะและโลหิต ระบายอ่อนๆ ระงับอาการหอบ แก้ลมจูกเสียด ใบ ใช้ต้มน้ำแข็งตัวสำหรับ แก้อัมพฤกษ์ อ้มพาต



ผักกาดน้ำ



ชื่อวิทยาศาสตร์ Plantago major Linn.

ชื่อวงศ์ Plantaginaceae

ชื่อสามัญ Plantain

ชื่ออื่น หญ้าเอ็นยีด หญ้าเอ็นอีด (เชียงใหม่) หมอน้อย เขียวจอยเช่า ตะปูกซี้ ยำผ่าวเช่า(จีน)

ลักษณะ เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นอยู่ใต้ดิน ใบออกขึ้นมาจากดิน ก้านยาว ใบรูปกลม โคนเรียว แหลม ปลายปานแหลมหนา คล้ายใบผักกาดนา เส้นใบเวิ่งตามยาว ๕ เส้น สีเขียวไม่เข้ม ดอกเล็ก ๆ ไม่มีก้าน ออกเป็นช่อเล็กๆตามติดตามก้านที่พุ่งจากดิน ลักษณะแห้งผลเล็กเมื่อแก่แตก กลาง มักเกิดตามที่ลุ่มทั้งที่มีน้ำท่วม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ผักกาดน้ำ

ใช้ทั้งต้น รสจืดเย็น สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้ไข้ร้อน แก้กามโรค ระงับความร้อน
แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ

ผักกุด



ชื่อวิทยาศาสตร์ Thelypteris interrupta (Will d.) K.Iwats./Athyrium Eseulentum Copel.

ชื่อวงศ์ DRYOPTERIDACEAE

ชื่อสามัญ Oak fern

ชื่ออื่น กุด

ลักษณะ ต้น เป็นไม้ต้นเตี้ยพากเดียวกับเฟิน ความสูง ๖-๑๘ ซม. โคนต้นพองออกมีขนสีน้ำตาลแดง โดยรอบ ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองหรือสามชั้น ยาว ๑.๘-๔.๕ เมตร ใบย่อยรูปขอบขนานกว้าง ๑-๔ ซม. ยาว ๑๐-๓๐ ซม. ปลายใบแหลมขอบใบเรียบเป็นหยักเล็กน้อย อับ สปอร์แตกตามยาวอยู่ใต้ใบ หัว เป็นเหง้า

ผักกุด ไม้ต้นเล็ก ๆ ขึ้นอยู่ริมน้ำ

ใบ รสเย็น สรรพคุณ แก้ไข้แก้ตัวร้อน แก้พิษอักเสบ



ผักขี้นจ่าย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aquilegia vulgaris L. var. Dulce Pers.*

ชื่อวงศ์ Umbelliferae

ชื่อสามัญ Celery , Smallage

ชื่ออื่น ผักปีม ผักข้าวเป็น ผักปีน(เหนือ) หั่งชึง ขิงฉ่าย(แต้จิว) ยันฉิน

ฉันฉ่าย (จีนกลาง)

ลักษณะ ต้น เป็นไม้ล้มลุกจะมีอายุได้นานประมาณ ๑-๒ ปี และมีกลิ่นหอมทั้งต้น ส่วนลำต้นนั้นจะกลวง สูงประมาณ ๓๐-๕๐ ซม. ใบ เป็นใบรวม ประกอบด้วยใบย่อย ๒-๓ คู่ ขอบใบจะหยัก เป็นแฉกเล็ก แต่ละแฉกนั้น เป็นรูปสามเหลี่ยม หรือห้าเหลี่ยมดอกออกเป็นช่อคล้ายช่รั่ม ตรงยอดดอกนั้นแห้ง เป็นรัศมี ดอกมี ขนาดเล็ก เป็นดอกสมบูรณ์ เพศผล มีลักษณะคล้าย ขนาดเล็ก สีน้ำตาลอ่อน มี กลิ่นหอม จะให้ผลเพียงครั้งเดียว ขี้นฉ่าย (*Celery*) มี ๒ พันธุ์ พันธุ์หนึ่งเป็นขี้นฉ่ายจีน (Chinese celery) มีขนาดลำต้นเล็กสูง ๓๐ ซม. ใบค่อนข้างแก่ อีกพันธุ์เป็นขี้นฉ่ายฝรั่ง ต้นยาวใหญ่มาก ลำต้นสูงถึง ๔๐ – ๖๐ ซม. สีลำต้นค่อนข้างขาวเหลือง ใบสีเหลืองอมเขียว

ผักขี้นฉ่าย ไม้ต้นเล็ก

ใช้หั่งต้น รสเย็นหอม สรรพคุณ ลดความดันโลหิต บำรุงร่างกาย แก้เบาหวาน

ผักโขมหนาม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Amaranthus spinosus L.*

ชื่อวงศ์ Amaranthaceae

ชื่อสามัญ Chineses spinach

ชื่ออื่นๆ ผักโขม(กลาง) ผักโหมะ ผักหมม(ใต้) ผักโหมะเกลี้ยง

(แม่อ่องสอน) กระเหเมื่อลาเตอ (กระเหรียงแม่อ่องสอน)

ลักษณะ ไม้ล้มลุกตูดเดียว ลำต้นตั้งตรง กลมมนหรือเป็นสันป้าน แตกกิ่งก้านมาก ผิวเรียบหรือมีขน เล็กน้อย ใบเดียว เรียงสลับ รูปไข่แกมขอบขนานแกมใบหอก เมื่ออ่อนอยู่มีขันเล็กน้อยที่เส้นใบ ดอกช่อออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยเรียงตัวอัดกันแน่น มีหนาม ไม่แข็ง กลีบร่วมโคง ขอบกลีบใส ตรงกลางมีแถบสีเขียวหรือม่วง แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ผลแห้งแตกได้รูปขอบขนาน ปลายแยกเป็น ๓ พู

ผักโขมหนาม ไม้ต้นเล็กๆ มีหนามตามข้อ

ราก รสอมเย็นชื่น สรรพคุณ แก้ช้ำใน แก้ไข้ แก้ตัวร้อน แก้เด็กลิ้นเป็นฝ้าลະองเจริญอาหาร



ผักโขมหัด

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Amaranthus vividis L.*

ชื่อวงศ์ AMARANTHACEAE

ชื่อสามัญ Amaranth /Green Amaranth /Slender amaranth

/Wild blite.

ชื่ออื่น ผักหมม ผักหมมหัด ผักโขม ผักโขมไทย

ลักษณะ ไม้ล้มลุกตุดิ่ยว่า ลำต้นตรง สูง ๑๐-๓๕ ซม. แตกกิ่งก้านน้อยโกล์โคนตัน มีขันหนาแน่น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบนานแกมใบหอก รูปไข่กลับแกมวงรีกว้าง ๐.๓-๑ ซม.ยาว ๑-๓ ซม. ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบเรียว ปลายสอบเข้าหากันใบ ขอบใบเจ้าโค้งมนหรือกึ่งฟันเลื่อย ท้องใบเกลี้ยง ดอกช่อกระจะออกที่ซอกใบ และปลายยอด ดอกย่อย ๒-๑๐ ดอก มีขันหนาแน่น ใบประดับรูปหอกแแคบ กลีบดอกสีม่วง เชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น ๒ ปาก ปากบนแยกเป็น ๒ พูรูปโล่ ปากล่างแยกเป็น ๓ พู ผลเป็นฝักแห้ง แตกได้ รูปกระวย ปากบนแยกเป็น ๒ พูรูปโล่ ปากล่างแยกเป็น ๓ พู ผลเป็นฝักแห้ง แตกได้ รูปกระวย

ผักโขมหัด ไม่ต้นเล็ก

ราก รสเย็นชื้น สรรพคุณ แก้พิษร้อนภายใน ต้มเอาน้ำอาบ แก้เม็ดผื่นคัน ถอนพิษไข้ แก้سمะ ขับปัสสาวะ

ผักโขมหิน(ผักขมหิน)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Boerhaavia diffusa L.*

ชื่อวงศ์ NYCTAGINACEAE

ชื่อสามัญ Pigweed /Spreading hog weed

ชื่ออื่น ผักขมหิน นังกุ้แซ ปังແປ ผักขมฟ้า ผักบี้ดิน ผักเบี้ยหิน

ลักษณะ ไม้ล้มลุกลำต้นทอดเลี้ยงชูยอดขึ้น แตกกิ่งก้านมาก สูงได้ถึง ๑ ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกนขอบนานหรือรูปใบหอก ปลายแหลมหรือมน โคนใบรูปปิ่มหรือมน ท้องใบมีสีอ่อนกว่าหลังใบ มีต่อมสีแดงตามแนวขอบใบ ดอกช่อคล้ายชีร์รัม รวมกันเป็นช่อแยกแขนง ดอกย่อยหลายดอก กลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง สีขาว ชมพูหรือแดง ผลรูปกระบอก ยาว ๒-๓ มม. ขอบเป็นสัน ๕ สัน

ผักโขมหิน(ผักขมหิน)

ต้น รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ ขับลมให้ผายเรอ แก้سمะและดีพิการ



ผักขวาง(สะเดาดิน)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Glinus oppositifolius* (L.) A.DC.

ชื่อวงศ์ Molluginaceae

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น ผักขวาง สะเดาดิน (ภาคกลาง) ผักขี้ขวาง (ภาคเหนือ)



ลักษณะ พืชล้มลุก ลำต้นหอดเลี้ยงแตกแขนงแผ่ออกครอบคลุม
ดินคล้ายพรม ใบมีขนาดเล็กเรียวยาว ออกจากบริเวณข้อของลำต้นข้อละ ๔-๕ ใบ ขอบใบ
เรียบ ก้านใบสั้น ดอก ออก ออกรอบๆ ข้อ ข้อละ ๔-๖ ดอก มีกลีบดอก ๕ กลีบ สีขาวอมเขียว ติด
ผลรูปไขว้ เมื่อผลแก่จะแตกออกเป็นสามแฉก ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลแดงจำนวนมาก พบน้ำ
บริเวณชื้นและ

ผักขวาง(สะเดาดิน) ไม่เลือยต้นเล็ก

ใช้ทั้งต้น รสมัน สรรพคุณ บำรุงน้ำดี ระบบความร้อน ทำให้ลดอุบัติสุขหัวเด็ก แก้หวัดคัดจมูก

ผักคราดหัวเหวน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Acmella oleracea* (L.) R.K.Jansen / *Spilanthes acmella* (L.) Murray

ชื่อสามัญ Para cress , Tooth-ache Plant

ชื่อวงศ์ Asteraceae (Compositae)

ชื่ออื่น ผักคราด ผักเผ็ด อิงฟายเกี้ย

ลักษณะ ไม่ล้มลุก สูง ๓๐-๔๐ ซม. ลำต้นมักหอดเลี้ยง ปลายยอดตั้ง ต้นสีเขียวปนสีม่วงแดง มีขน ใน
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม สับตั้งจาก รูปสามเหลี่ยม กว้าง ๓-๔ ซม. ยาว ๓-๖ ซม.

ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบสีเขียว มีขนประปรายทั้งสองด้าน ดอก
ออกเป็นช่อรูปกรวยกว่า ตามซอกใบ ดอกสีเหลือง ผล เป็นผลแห้ง รูปไข่

ผักคราดหัวเหวน ไม่ต้นเล็ก

ใช้ทั้งต้น รสเผ็ดร้อน เป็นยาแก้ไข้ แก้พิษดานชาด แก้ริดสีดวง แก้ผื่น แก้แพ้ แก้ตัว
ร้อน แก้ปอดบวม แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ



ผักเคล็ด



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cassia sophera* Linn.

ชื่อวงศ์ CAESALPINEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น ผักเคล็ด ผักเห็ด ขี้เหล็กฝี ขี้เหล็กน้อย ขี้เหล็กเทศ ผักหวานบ้าน

ลักษณะ ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาอกรอบ ๆ ต้น กิ่งก้านไม่ใหญ่นัก ใบเดี่ยว ลักษณะของใบ เป็นรูปมนรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ลักษณะของใบคล้ายกับใบสมสารหรือใบมะยม มีสีเขียวเป็นมัน ดอกออกเป็นช่ออยู่ตามจ่ามใบ มีสีเหลืองคล้ายกับดอกขี้เหล็ก ผลเป็นรูปผัก และจะแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ลักษณะคล้ายกับผักถั่วเขียว

ผักเคล็ด ไม้พุ่มขนาดเล็ก

ใบ รสชื่นชม สรรพคุณ ต้มเอานำ้าอาบ แก้บاتแผล แก้ผื่นคัน

ราก 涩心 สรรพคุณ แก้พิษร้อนภายในร่างกาย

ผักชีลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Coriandrum sativum* Linn.

ชื่อวงศ์ UMBELLIFERAE

ชื่อสามัญ Coriander

ชื่ออื่น ผักหอมน้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผัก

หอมป้อม ผักหอมพอmom (ภาคเหนือ) พังไน (จีน-แต้จิว) ผักหอม (นครพนม) ผักชีลา

ลักษณะ ไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นตั้งตรง ภายในจะกลวง และมีกิ่งก้านที่เล็ก ไม่มีขน มีรากแก้วสั้น แต่ราก ฟอยจะมีมาก ลำต้นสีเขียวแต่ถ้าแก่จัดจะออกเขียวอมน้ำตาล ใบจะเรียงคล้ายขนนก แต่อยู่ใน รูปทรงพัด ดอกออกเป็นช่อ ตรงส่วนยอดของต้น ดอกมีขนาดเล็กอยู่ ๕ กลีบสีขาวหรือชมพู อ่อนๆ จะติดผลในฤดูหนาว เป็นทรงกลมโตประมาณ ๓-๕ มม. ตรงปลายผลแยกเป็น ๒ แฉก ตามผิวจะมีเส้นคลื่นอยู่ ๑๐ เส้น

ผักชีที่ปลูกกันแพร่หลายในประเทศไทยมี ๒ ชนิดคือ

๑. พันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะใบบาง ต้นเล็ก เมล็ดเล็ก ออกดอกเร็ว อายุสั้น มีกลิ่นหอมฉุน

๒. พันธุ์อินเดีย มีลักษณะใบใหญ่หนา ต้นใหญ่ กลิ่นหอมเล็กน้อย อายุยาวกว่าพันธุ์พื้นเมือง

ผักชีลา ไม้ต้นเล็ก ๆ

ลูก 涩心 ผัดร้อนหอม สรรพคุณ แก้ไข้เนื่องจากชา แก้กระหายน้ำ บำรุงธาตุ แก้คื่นเหียน อาเจียน ขับลมในลำไส้ แก้สะอึก แก้ตัวเจ็บ

ราก 涩心 สรรพคุณ กระหุงพิษเขี้ยวหัว หัดเหือด สูกใส ดำเนง แก้ไอ เจ็บคอ





ผักชีล้อม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Oenanthe javanica* (Blume) DC.

ชื่อวงศ์ UMBELLIFERAE (APIACEAE)

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น ผักอันอ้อ

ลักษณะ ไม้ล้มลุกชอบน้ำซึ่งขึ้นในที่ชื้นและ ในประกอบแบบบนน้ำสองชั้น เรียงสลับใบย่อยรูปใบหอก ดอกช่อออกที่ปลายยอด กลีบดอกสีขาว ก้านดอกย่อยยาวเท่ากัน ผลเป็นผลแห้งแตกได้ รูปไข่กลับ

ผักชีล้อม ไม้ต้นเล็กๆ

เมล็ด รสหอมร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ ขับลมในลำไส้ แก้ร้าตุพิการ แก้ไอ แก้หอบ บำรุงปอด

ผักตับเต่าน้ำ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hydrocharis dubia* (Bl.) Back. /*Hydrocharis morsus ranae* Linn.

ชื่อวงศ์ HYDROCHARITACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น ผักตับเต่า ตับเต่า�้า

ลักษณะ วัชพืชน้ำที่มีลำต้นเจริญเติบโตอยู่ในน้ำ มีรากและสามารถแตกใหม่เป็นเส้นสีขาว ปลายแหลม เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ ในเมืองร้อนกลมแบบใบบัวก ฐานใบเว้าเข้าหากันเป็นรูปหัวใจ ก้านใบยาว ขอบใบเรียบ แต่ถ้าในฤดูแล้งมีน้ำน้อยก้านใบก็จะสั้นลง ใบเมื่อ löยน้ำจะมีลักษณะคล้ายตับเต่า ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนกลางแผ่นใบจะพองออกคล้ายกับหนุนไว้ด้วยฟองน้ำ ดอกออกตามซอกใบก้านดอกยาว ดอกมีสีขาวมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเกิดแยกกันคนละดอก มีใบประดับหุ้มดอกตัวผู้และก้านดอกตัวผู้จะเรียงยาวกว่าดอกตัวเมีย ติดผลคล้ายตะขบผึ้งแต่ก้านผลใหญ่

ผักตับเต่า�้า ไม่น้ำ

ใช้ทั้งต้น รสจืดเผื่อน สรรพคุณ แก้เสมหะและลม แก้เพ้อคลุ้ม แก้ไข้เพื่อดี ช่วยย่อยอาหาร



ผักหนอก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Centella asiatica* Urban

ชื่อวงศ์ Umbelliferae

ชื่อสามัญ Asiatic Pennywort, Tiger Herbal

ชื่ออื่น ผักแวน ผักหนอก

ลักษณะ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี เลี้ยวແಪໄປตามพื้นดิน ขอบที่ขึ้นและแตกรากฝอยตามข้อ ใบหลังที่ແປໄປจะงอกใบจากข้อซึ่งกัน ๓-๕ ใบ ในเดียว เรียงสลับ รูปไตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒-๕ ซม. ขอบใบหยักก้านใบยาว ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ขนาดเล็ก ๒-๓ ดอก กลีบดอกสีม่วง ผลแห้งแตกได้

ผักหนอก ไม้ตันเล็กๆ ในกลุ่ม

ใช้หั้งต้น รสมุลล์แก่น้อย สรรพคุณ ตำคั้นอาเน้ำรับประทาน บำรุงหัวใจ แก้ไข้ใน เนื่องจาก พลัดตกหล่ม แก้มเมื่อยล้า อ่อนเพลีย แก็บิด ห้องเสีย.

ผักบุ้งขาว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ipomoea carnea* Jacq

ชื่อวงศ์ CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น -

ลักษณะ ผักบุ้งต้นเป็นไม้พุ่ม น้ำยางสีขาว ในเดียว เรียงเวียน ดอกช่อ กลีบดอกสีชมพูอ่อนหรือ ม่วงอ่อน ออกที่ทั้งใบและปลายกิ่ง ผลแห้งแตก

ผักบุ้งขาว ไม้เลื้อยทอดยอด

ใบ เค้า รสเย็น สรรพคุณ ถอนพิษทั้งปวง แก้พิษเบื้องมา แก้ต้าฟาง
ใบ ทำพอก แก้พิษฝี ถอนพิษอักเสบ



ผักบุ้งจีน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ipomoea aquatica* Forsk. Var. *reptan*

ชื่อสามัญ water convolvulus / kang-kong

ชื่อวงศ์ Convolvulaceae

ชื่ออื่น -

ลักษณะ ไม่เลื้อยชนิดหนึ่งที่มีเนื้ออ่อน ลำต้นจะกลวงและเป็นปล้อง ๆ มีสีเขียว จะเลื้อยขึ้นแผ่ตามหน้าน้ำ หรือในที่ลุ่ม ตามพื้นที่มีความชื้น และแฉะ เป็นสีเขียวเข้ม ลักษณะของใบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม จะออกเป็นใบเดียวสลับทางกันตามข้อต้น ใบยาวประมาณ ๒-๓ นิ้ว ลักษณะของดอกเป็นรูประฆังเล็ก มีสีขาวอ่อน ๆ หรือสีม่วง ดอกจะบานเต็มที่ประมาณ ๒ นิ้ว ดอกจะตกในดินแล้วล้าง

ผักบุ้งจีน ไม้ตันเล็กๆ

ใช้หั้งต้น สราย์น สรรพคุณ แก้พิษฝี ถอนพิษอักเสบ ถอนพิษยาเบื้องมา

ผักบุ้งแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ipomoea aquatica* Forsk.

ชื่อวงศ์ CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ Swamp cabbage

ชื่ออื่น ผักทดลอง ผักบุ้ง ผักบุ้งแดง ผักบุ้งนา กำจار โหนเดา

ลักษณะ ไม่เลื้อยชนิดหนึ่งที่มีเนื้ออ่อน ลำต้นจะกลวงและเป็นปล้อง ๆ มีสีเขียว จะเลื้อยขึ้นแผ่ตามหน้าน้ำ หรือในที่ลุ่ม ตามพื้นที่มีความชื้น และแฉะ เป็นสีเขียวเข้ม ลักษณะของใบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม จะออกเป็นใบเดียวสลับทางกันตามข้อต้น ใบยาวประมาณ ๒-๓ นิ้ว ลักษณะของดอกเป็นรูประฆังเล็ก มีสีขาวอ่อน ๆ หรือสีม่วง ดอกจะบานเต็มที่ประมาณ ๒ นิ้ว ดอกจะตกในดินแล้วล้าง

ผักบุ้งแดง ไม่เลื้อยทดลอง ต้นและยอดมีสีแดง

ใบ เกา สราย์น สรรพคุณ ถอนพิษยาเบื้องมา แก้ต้าฟาง ตามัว

ใบ สรรพคุณ ตำพอก แก้พิษฝี ถอนพิษอักเสบ



ผักบูบี้รั่วม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Enydra fluc tuans* Lour.

ชื่อวงศ์ ASTERACEAE [COMPOSITAE]

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น ปลิง กາล่อ ผักดีเหียยิน ผักແປ່ງ ผักบູບຸ້ຮັວມ

ลักษณะ พืชล้มลุก มีลำต้นหอดเลือยตามพื้นน้ำ ปลายยอดสูง ๑๕-๖๐ ซม. ลำต้นคล่อง มีรากออกตามข้อ ใบรูปขอบขนานแคบ ออกตรงข้าม ไม่มีก้านใบ ดอกสีขาวแกมเขียว ออกเป็นกระจุก ค่อนข้างกลม ออกตามปลายยอดหรือซอกใบ ไม่มีก้านดอก มีใบประดับรูปไข่ ๔ อัน ดอกวงนอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็นแฉกสั้น พบที่นำไปในเขตร้อน ชอบขึ้นตามที่ชื้นและหรือมีน้ำขังเล็กน้อย ยอดอ่อนรับประทานได้ ต้นอ่อนเป็นยาเจริญอาหาร ใบตำพอกแก้โรคผิวหนังและเป็นยาระบาย

ผักบูบี้รั่วม ไม่น้ำ

ใช้ทั้งต้น รสอมเย็น สรรพคุณ แก้พิษทั้งปวง ใช้ต้มเข้ากระโลมเอ้าไออร์ม ขับเหื่อ แก็บวม เห็นบชา ถอนพิษได้ดี

ผักเบี้ย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Trianthema Decandra* Linn.

ชื่อวงศ์ AIZOACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น ผักเบี้ย

ลักษณะ ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนเล็ก ๆ ลำต้นเล็ก ๆ เลือยอดตามพื้นดินเรื่อย ๆ ลำต้นสีน้ำตาลเป็นไม้อ่อนไปทั้งต้น กิ่งของใบแยกจากกิ่ง ลำต้นทั้งสองข้างมีสีเขียวค่อนข้างดำ ในเสกยาระมาณ ๒-๔ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๑-๒ เซนติเมตร มีดอกสีเหลืองๆ เล็กๆ ขึ้นที่ปลายยอดของกิ่งใบ

ผักเบี้ย ไม่ต้นตัวเล็ก ๆ มี ๒ สายพันธุ์ มีผักเบี้ยเล็ก กับผักเบี้ยใหญ่

ใบ รสเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน แก้พิษตานชาติ



ผักเป็ดขาว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Alternanthera paronichyooides* St. Hil.

ชื่อวงศ์ AMARANTHACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น -

ลักษณะ ไม้ล้มลุก สูงไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร บางครั้งลำต้นเลือยไปตามดิน ดอกสีขาวเล็กๆ เป็นพีช
อบน้ำ มี ๒ สี คือ ใบและลำต้นสีเขียว เรียกว่า ผักเป็ดขาว ใบและลำต้นสีม่วงแดง เรียกว่า
ผักเป็ดแดง

ผักเป็ดขาว ไม้เลือยตามพื้นดิน

ใช้ทั้งต้น รสขื่นเอียน สรรพคุณ ดับพิษโลหิต ทำให้โลหิตเย็น พอกและบำรุงโลหิต
แก้รังดูศรีน่าเหม็น แก้ปวดเอวและท้องน้อย

ผักเป็ดแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Alternanthera bettzickiana* (Regel) G.Nicholson

ชื่อวงศ์ AMARANTHACEAE

ชื่อสามัญ Joy weed.

ชื่ออื่น ผักเป็ดฟรัง; ผักโหมแดง (ภาคเหนือ); พรอมมิแดง (ภาคกลาง)

ลักษณะ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง สูง ๑๐-๒๐เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปสีเหลี่ยม
ขนน้ำเปียกปูน หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง ๐.๕-๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑-๕ เซนติเมตร สีแดง
ดอกเป็นช่อ รูปกระบอก หรือทรงกลมออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบรวมสีขาวนวล ผลแห้ง
รูปคล้ายโล้ เมล็ดสีน้ำตาล

ผักเป็ดแดง ไม้เลือยตามพื้นดิน

ใช้ทั้งต้น รสขื่นเอียน สรรพคุณ ดับพิษโลหิต ทำให้โลหิตเย็นเป็นยาระบายอ่อนๆ พอกและ
บำรุงโลหิต แก้รังดูพิการด้ำเหม็น แก้ปวดเอว และท้องน้อย



ผักปอตตัวผู้



ชื่อวิทยาศาสตร์ *sphenoclea zeylanica* Gaertn.

ชื่อวงศ์ SPHENOCLEACEAE

ชื่อสามัญ gooseweed, hollowstem

ชื่ออื่น ผักปอดนา ผักจุ่มป่า ผักกุ่มป่า ผักปูมป่า ผักปูมปลา ผักปอดนา

ลักษณะ พืชอายุหลายปี ลำต้น อบรม้ำสูง ๓๐-๖๐ ซม. โคนต้นมีปลอกคล้ายฟองน้ำสีขาวหุ้ม ใบ เดี่ยว

ติดแบบสับปะรดหรือรูปขอบขนาน กว้าง ๑ ซม. ยาว ๒.๕-๓.๕ ซม. ดอก สีขาวออกเป็นช่อ
แบบช่อกระจะลักษณะเป็นก้อนรีสีเขียว กลีบดอกฐานประแจง ผล กลมมีเคลือบสีขาวเมื่อแก่จะ^{จะ}
แตก เมล็ด จำนวนมาก สีเหลืองหรือสีน้ำตาล

ผักปอดตัวผู้ ไม่ใบเล็ก ๆ ขึ้นตามท้องนา

ผักปอดตัวเมีย เหมือนกับผักปอดตัวผู้ แต่ต้นและใบใหญ่กว่า

ราก รากขี้นร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้โลหิตพิการ ขับลมให้กระจาย

ต้น รสขี้นเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ปวดมดลูก แก้สันนิบาตหน้าแพลง



ผักปลัง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Basella alba* Linn. (ผักปลังขาว) / *Basella rubra* Linn. (ผักปลังแดง)

ชื่อวงศ์ BASELLACEAE

ชื่อสามัญ Indian spinach / Ceylon Spinach

ชื่ออื่น ผักปลัง (ใต้ กลาง) ผักปั่ง(เหนือ)

ลักษณะ ไม้เลื้อย ลำต้นกลม โ琬น้ำไม่มีขัน แตกกิ่งก้านสาขาได้มาก ลำต้นเป็นสีเขียวหรือสีม่วงแดง แผ่นใบโ琬น้ำใบรูปร่างเป็นรูปไข่หัวใจหรือปอนขอบขนาน ในลักษณะมัน ไม่มีขัน หากขี้ดูจะ เป็นเมือก เหนียว ดอกเป็นดอกช่อ ดอกของผักปลังขาวสีขาว ดอกของผักปลังแดงสีขาวอม ชมพู ใบประดับ ๒ ใบเล็กๆ ติดกันและปลายแยกออกเป็น ๕ กลีบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕-๖ มม. ลูกแก่จะมีสีม่วงอมดำ เนื้อนิ่มภายในผลมีน้ำสีม่วงดำหรือสีขาว

ผักปลัง ไม้เลื้อยมี ๒ ชนิด คือ ชนิดแดง และชนิดขาว สรรพคุณเหมือนกัน

ต้น รสเย็น สรรพคุณ แก้พิษฝี แก้อักเสบ

ใบ รสเย็นเบื่อ สรรพคุณ แก้กัดลาก

ดอก รสเย็นเบื่อ สรรพคุณ แก้เกลื้อน

ราก รสเย็นเบื่อ สรรพคุณ แก้โรคผิวน้ำ แก้รัง凸 แก้ท้องผูก



ผักแพ่แดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Iresine herbstii* Hook.

ชื่อวงศ์ AMARANTHACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น ผักแพ่แดง ผักแพ่สวน อีเปะ

ลักษณะ ไม้ล้มลุก ใบประกอบชนิดมีใบย่อยใบเดียว เรียงตรงข้าม ใบสีแดงเห็นเส้นใบชัดเจน ดอกช่อ
สีขาวแกมเหลือง มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและแยกเพศ ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก

ผักแพ่แดง ไม้ต้นเล็กๆ

ราก รสเผ็ด สรรพคุณ แก้ลม แก้กระเพาะอาหารพิการ อุจจาระหายาบ แก้ท้องมาน
แก้ริดสีดวง แก้หืดไอ แก้เส้นประสาทพิการ แก้ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก

ผักหวานบ้าน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Sauvagea androgynus*

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Euphorbiaceae

ชื่ออื่น ก้านตรง จ้าผักหวาน โถหลุยksenii เต้าะ นานาเชี่ยม ผักหวานใต้ใบ และมะยมป่า

ลักษณะ ผักหวานบ้านเป็นไม้พุ่ม สูง ๐.๘ - ๒ เมตร กิ่งก้านค่อนข้างเล็ก สีเขียวปนเทา ใบเป็นใบเดียว
ก้านใบสั้น ประมาณ ๒ - ๔ มม. ใบออกแบบสลับ รูปร่างกลมรูปขอบขนาน หรือค่อนข้างเป็น
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใบกว้าง ๒ - ๓.๒ ซม. ยาว ๓.๒ - ๖ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน
ขอบใบเรียบ และมีหูใบเป็นแผ่นเล็ก ๆ ที่โคนก้านใบ ดอกสีม่วงแดงหรือแดงเข้มกลุ่มละ ๒ -
๔ ดอก เป็นดอกเดี่ยวออกตรงซอกใบ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกัน ผลรูปร่างคล้ายลูก
มะยม เรียงกันอยู่ต่ำไป ผลมี ๓ พู สีขาวนวลและออกสีชมพูเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๑.๐ - ๑.๕ ซม. เมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก

ผักหวานบ้าน ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ราก รสเย็น สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้กลับ

ไม่ควรรับประทานมากในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะ รับประทานมากๆอาจทำให้มี
อาการปวดหลัง



ผักหวานป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Melientha suavis* Pierre

ชื่อสามัญ Pak-wan Tree

ชื่อวงศ์ Opiliaceae

ชื่ออื่น ก้านตรง จ้าผักหวาน โคลหลุยกะนิ เต้าะ นานาเชี่ยม ผักหวานใต้ใบ
และมะยมป่า

ลักษณะ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นที่โตเต็มที่อาจสูงถึง ๑๓ เมตร แค่ที่พับ

โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือเป็นไม้พุ่ม เนื่องจากมีการหักกิ่ง เด็ดยอด
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิ่งและยอดอ่อน ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้บริโภค ใบของผักหวานป่าเป็นใบเดี่ยวเรียง
สลับกัน ใบอ่อนรูปร่างแคนบี ปลายใบแหลม สีเขียวอมเหลือง ใบแก่เต็มที่รูปร่างรีกว้างถึงรูป
ไข่หรือรูปไข่กลับ ใบสีเขียวเข้ม เนื้อบางรอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบมน ขนาดของใบประมาณ
๒.๕-๕ ซม. x ๖-๑๒ ซม. ก้านใบสั้น ช่อดอกแตกกิ่งก้านคล้ายช่อดอกมะม่วงหรือลำไย และ
เกิดตามกิ่งแก่ หรือตามลำดับต้นที่ใบร่วงแล้ว ดอกมีขนาดเล็กเป็นตุ่มสีเขียวอัดกันแน่นเป็น^ก
กระฉูกขณะที่ยังอ่อนอยู่ ผลเป็นผลเดี่ยว ติดกันเป็นพวง เมื่อнос่องจะมีไฟหรือแสงสาด
แต่ละผลมีขนาดประมาณ ๑.๕ x ๒.๕ ซม. ผลผ่อนสีเขียวมีน้ำลากลีบและเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองถึงเหลืองอมส้ม เมื่อผลสุกแต่ละผลมีเมล็ดเดียว

ผักหวานป่า ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ราษฎร เชื่อว่า สรรพคุณ แก้ดีพิการ แก้เชื่อมมัว แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้กระสับกระส่าย

ผักแวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Marsilea crenata* Prel.

ชื่อวงศ์ MARSILEACEAE

ชื่อสามัญ Water Clover.

ชื่ออื่น ผักลินปี (ใต้) หนูเต้าะ (กระเรรี่ยง
- แม่ย่องสอน)



ลักษณะ ผักแวง จัดเป็นเฟินน้ำ ลำต้น ค่อนข้างกลม มีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ลำต้นอ่อนมีสีเขียว
เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ลักษณะเป็นเหล้าเราเลี้ยงไปตามพิวดินหรือผิวน้ำ โคลนเลน ใบ
เป็นใบประกอบมีใบย่อยทั้งสี่ใบรูปกรวยปลายมนเป็นรูปลิ่มคล้ายพัด ซึ่งแต่ละใบจะมีเส้นใบ
แบบ cichotomous คล้ายบัวแยก ขนาดใบกว้าง ๐.๖-๑.๕ ซม. ยาว ๐.๙-๑.๙ ซม. โคนใบ
สอบ ขอบใบเรียบ หรือหยักเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ หรือหยักเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ ไม่มีขน
ออกจากตรงกลางตำแหน่งเดียวกัน ใบทั้งหมดรวมกันเป็นลักษณะกลม ก้านใบยาว ๔.๕-๑๕
ซม. ใบย่อยไม่มีก้านใบ มี sporocarps เป็นก้อนแข็ง ๆ สีดำ รูปขนาด หรือรูบเริคคล้ายเมล็ดถั่ว
เขียว ออกที่โคนก้านใบขณะอ่อนมีสีขาว เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ

ผักแวง ไม้ต้นเล็ก อยู่ริมน้ำ ชูใบ ก้านยาว

ใช้หั้งต้น สรรพคุณ แก้سمหน แก้ดีเดือด เจริญอาหาร แก้อักเสบทุกชนิด แก้ปิด^ก
แก้ท้องเสีย(ใช้ส่วนที่มีรสมاء)



ผักเสี้ยนไทย



ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra L.

ชื่อวงศ์ CAPPARACEAE

ชื่อสามัญ Wild spider flower

ชื่ออื่น ส้มเสี้ยน(ภาคเหนือ) ผักเสี้ยนไทย ผักเสี้ยนตัวผู้

ลักษณะ ต้นเป็นพืชล้มลุกปีเดียว ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งแขนงข้าง มี ๒ ชนิด ลำต้นสีแดงและลำต้นสีเขียว ลำต้นมีขนสั้นๆ ปกคลุม และมียางเหนียว ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓-๕ ใบ ใบย่อยมีลักษณะรูปไข่กลับหรือขอบมน ปลายแหลมโคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น ใบทรงกลามมีความยาว ๒-๗.๕ ซม. กว้าง ๑-๔ ซม. มีขนปกคลุมทั่วไปและมียางเหนียว ดอก เป็นดอกช่อสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน (ผักเสี้ยนผิดอกสีเหลือง) กลีบเรียง ๔ กลีบ กลีบดอก ๔ กลีบ เป็นรูปไข่กลับ ยาว ๘-๑๔ มม. เกสรตัวผู้มี ๖ อัน ดอกมีก้านของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียไว ผล เป็นฝักเล็กเรียวยาว ยาว ๔-๗ ซม. กว้าง ๓-๔ มม. ผลอ่อนสีเขียวแก斯基้น้ำตาล เมื่อแก่แล้วแตก เป็น ๒ ซีก มีเมล็ด ๑๐-๕๐ เมล็ดต่อฝัก เป็นรูปไตเรียงอยู่ในฝัก เมล็ดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ มม.

ผักเสี้ยนไทย ไม่ต้นเล็กๆ

ต้น รสขื่นร้อนฉุน สรรพคุณ ขับโลหิตระดูที่เน่าเสีย

เมล็ด รสเผา สรรพคุณ ขับไส้เดือนในท้อง ให้น้ำไปดองหรือผ่านความร้อนก่อนนำมารับประทาน



ผักเสี้ยนผี



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cleome viscosa* Linn.

ชื่อวงศ์ CLEOMACEAE

ชื่อสามัญ Polanisia Vicoso

ชื่ออื่น ผักส้มเสี้ยนผี ส้มเสี้ยนตัวเมีย ไปนิพพานไม้รากลับ

ลักษณะ ต้นไม้มีลักษณะตั้งตรงแก่กิ่งก้านรอบต้น สูงประมาณ ๑ เมตร มีข้อสีเหลืองปุกคลุมทั่วต้น และ เมือกเหนียวๆ อยู่ภายใต้ต้น มีกลิ่นเหม็นเขียว ใบประกอบ ๓-๕ ใบ ติดที่ปลายก้าน ในยื่อยรูปไข่ ปลายและโคนแหลมมีขันอ่อนปุกคลุม เนื้อใบบางนุ่ม ใบกว้างประมาณ ๐.๕-๑ นิ้ว ยาวประมาณ ๐.๕-๒ นิ้ว ใบกลางจะมีขนาดใหญ่กว่า ใบมีกลิ่นฉุน ดอก ออกเป็นช่ออยู่ตามจั่มใบหรือที่ปลายกิ่ง ดอกเล็กๆ สีเหลืองบางและเกลี้ยง ที่ปลายดอกจะมีจังอยแหลมมีขันปุกคลุมเล็กน้อย (ดอกจะบานในวันเดียวคือตอนเช้า) ผล เป็นฝักกลมยาวคล้ายผักถั่วเขียว แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ตรงปลายผลมีจังอยแหลม ผลกว้างประมาณ ๒-๔.๕ มม. ยาวประมาณ ๑-๔ นิ้ว เมล็ดสีน้ำตาลแดงผิวย่น

ผักเสี้ยนผี มีต้นเล็กๆ

ต้น รสมร้อนเหม็นเขียว สรรพคุณ ทำให้หันองแห้ง

ใบ รสมร้อน สรรพคุณ แก้ปัสสาวะพิการ นำมาเป็นส่วนผสมของลูกประคบ ช่วยแก้ปวดข้อได้ดี ดอก รสมร้อน สรรพคุณ ฆ่าพยาธิพิวนัง

ลูก รสมร่า สรรพคุณ ฆ่าพยาธิ

ราก รสมร้อน แก้กัด สรรพคุณ แก้สตรีผอมแห้งเนื่องจากอยู่ไฟไม่ได้ แก้ผื่นท้อง

ใช้ทั้ง ๕ สรรพคุณ คุณธาตุ แก้ลม แก้ปวดท้อง เจริญไฟธาตุ แก้ห้องร่วง แก้ผื่นตับ ปอด ฟืน ลำไส้ ขับพยาลงม



ผักหูปลาช่อน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Emilia sonchifolia* DC.

ชื่อวงศ์ ASTERACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่อท้องถิ่น ผักลินปี(อีสาน) ผักบัง(ลำปาง) ผักแಡง(เลย) ผักกาดนอกเขา(ภาคใต้) หางปลาช่อน

ลักษณะ พืชล้มลุก สูง ๑๐ – ๒๕ เซนติเมตร ลำต้นและใบมีขนอ่อนปุกคลุม ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ
ปลายแหลมหรือมน ขอบใบหยักเล็กน้อย ลักษณะคล้ายหูปลาช่อน หลังใบสีเขียว ได้ท้องใบสี
ม่วง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกสีชมพูม่วง

ผักหูปลาช่อน เป็นไม้ต้นเล็กๆ คล้ายโถไม่มีราก แต่เล็กกว่า

ต้น รสจืดเหมือนเขียวเล็กน้อย สรรพคุณ แก้พิษตานชาต แก้ฝีตานชาต เม็ดผื่นคัน แก้ตัวร้อน
ดอกร ใช้แก้ไข้เจ็บคอ

ผักหนามป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lasia spinosa* Thw.

ชื่อวงศ์ ARACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น กะลี

ลักษณะ ผักหนามเป็นไม้พุ่มในบริเวณที่ชื้น ริมหนองน้ำ ข้างลำ

รา หรือริมแม่น้ำในป่าดงดิบกระจายในทุกภาคของเมืองไทย ผักหนามเป็นไม้ล้มลุกหลายปี
มีหนามแหลมตามลำต้น มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔ - ๕ ซม. ลำต้น
ทอดขนาดกับพื้นดิน ตั้งตรงและโคงลงเล็กน้อย ในเป็นใบเดี่ยว รูปหัวลูกศรหรือขอบใบยับเว้า
ลีกออกเป็นแฉก ๆ รอยเว้าลีกเกือบถึงเส้นกลางใบมีราก ๑ แท่ง ใบกว้างมากกว่า ๒๕ ซม.
ยาว ๓๐ - ๔๐ ซม. ก้านใบยาวประมาณ ๒๐ - ๔๐ ซม. มีหนามอยู่ตามลำต้นและก้านใบ ใน
อ่อนมวนเป็นแท่งกลม ปลายแหลม ช่อดอกเป็นแท่งและมีดอกร่ายอัดกันแน่น มีกาบทุมซ่อ
ดอกสีน้ำตาล ก้านช่อดอกยาวและมีหนาม ผลเป็นผลสด
สีเขียว ติดกันแน่นเป็นแท่งรูปทรงกระบอก

ผักหนามป่า ไม่น้ำเนื้ออ่อน

ใช้หั้งต้น สรรพคุณ แก้ปัสสาวะพิการ

* มีไซยาโนไดโนยดผักหนามสูง ไม่ควรรับประทานดิบๆ





กกลังกา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cyperus alternifolius* Linn.

ชื่อวงศ์ CYPERACEAE

ชื่อสามัญ Umbrella plant

ชื่ออื่น กกลังกา กกต้นกลม กกขนา กญ้าสเล็บ

หญาลังกา กกดอกแดง

ลักษณะ พืชจำพวกหญาเมืองกาดีดิน ลำต้นรูป

สามเหลี่ยมออกเป็นกอ ใบเป็นใบเดียวรูปยาวแคบออกที่โคนต้น ปลายใบเรียวแหลมดอก

ขนาดเล็กสีน้ำตาล ก้านซ่อดอกสีเขียวอ่อนเรียวยาว มีใบประดับแห่ซ้อนกัน

กกลังกา(กขนา) พากหญาต้นกลม หรือ สามเหลี่ยมมน

ต้น รสจัดเย็นอมน้อย สรรพคุณ ขับน้ำดีให้หกลงลำไส้

ใบ รสเย็นเบื้อง สรรพคุณ ช่วยพยาธิ

ดอก รส平淡เย็น สรรพคุณ แก้แพลงเปื่อยพุพองในปาก

ราก รสขมเยี้ยน สรรพคุณ แก้ไข้ใน ขับโลหิตเน่าเสียให้ออกจากร่างกาย

หัว รสขมเยี้ยน สรรพคุณ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้سمะเพื่อง



กะเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Eclipta prostrata* L.

ชื่อวงศ์ Compositae

ชื่อสามัญ False daisy , White head

ชื่ออื่น กะเมืองตัวเมีย คัดเมือง (ภาคกลาง)

บังกีเข้า (จีน) หญาสับ อ้อมเกี่ยว (ภาคเหนือ)

ลักษณะ ลำต้นตั้งตรงสูง ๓๐-๔๐ ซม. ลำต้น



กลม มีขนแข็งสากมือปกคุณแตกแขนงมาก ที่โคนต้นอาจมีสีแดงอมม่วง ใน เป็นใบเดียวออกจากลำต้น
ในลักษณะตรงข้ามเป็นคู่ ใบค่อนข้างแคบเรียวยาว

กะเมือง ไม้ต้นเล็กจำพวกหญา มี ๒ ชนิด คือ ชนิดดอกขาวและดอกเหลือง กะเมืองมีรากอ่อนและ

มีรากเหลืองเจือปนอยู่ด้วย

ต้น รสอ่อน สรรพคุณ ขับลมในกระジャ แก้จุกเสียดแน่นเพื่อ บำรุงโลหิต

ดอก รสอ่อน สรรพคุณ แก้ดีชาน ตับอักเสบ

ราก รสอ่อน สรรพคุณ ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหาร





หญ้ากระต่ายจาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Adenosma indiana* (Lour.) Merr.

ชื่อวงศ์ Scrophulariaceae

ชื่ออื่น พริกกระต่าย โซเซ

ลักษณะ พืชล้มลุกอายุปีเดียว ต้นตั้งตรง สูง ๒๐-๗๐ ซม. ทุกส่วนของลำต้นมีขนละเอียดสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม รูปไข่ กว้าง ๐.๕-๒ ซม. ยาว ๑-๗ ซม. ขอบใบจักพับเลือย แผ่นใบมีขนละเอียดทั้ง

หญ้ากระต่ายจาม ไม่ต้นเตี้ยใบเป็นพอย มักขึ้นในที่ชื้น หลังเกี่ยวข้าว

ต้น รสจืดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้โลหิตคั่งให้กระจายตามทวารหนัก แก้อาเจียน เป็นโลหิตแก้ฝ้าผาด แก้แพลงเรื้อรัง ราก รสเย็น สรรพคุณ แก้หนองใน แก้นิ่ว



หญ้าเกล็ดหอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Desmodium triflorum* (L.) DC.

ชื่อวงศ์ FABACEAE

ชื่อสามัญ Black Cover

ชื่อท้องถิ่น เกล็ดปลา ผักแวงดอย หญ้า atan thraiy

ลักษณะ พืชล้มลุกจำพวกหญ้า ลำต้นแผ่ແນບไปกับพื้นดินเป็นวงกว้าง

ลำต้นและใบมีขนปกคลุมหนาแน่น ใบแบบใบประกอบมีใบย่อย ๓ ใบ รูปไข่กลับ ปลายใบมนโค้งใบแหลม ดอกออกเป็นช่อเกิดตามซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผลเป็นฝักแบบยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร ฝักมีรอยคอดเป็นข้อๆ ตามจำนวนเมล็ด

หญ้าเกล็ดหอย ไม่เลือยตามพื้น มีสองชนิด คือ หญ้าเกล็ดหอยเล็ก กับหญ้าเกล็ดหอยใหญ่ ใช้ทั้งต้น รสเย็น สรรพคุณ ลดความร้อน แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ





หญ้าเกล็ดหอยจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Oxalis corniculata* L.

ชื่อวงศ์ OXALIDACEAE

ชื่อสามัญ Yellow Oxalis

ชื่ออื่น ผักแ渭นเล็ก ผักแ渭นเมืองจีน ส้มกบ(ภาคกลาง)

ส้มสามตา(เชียงใหม่) ส้มดิน(แม่ย่องสอน)

ลักษณะ พืชขนาดเล็กขอบขี้นที่ชื้นและสูง ๑-๕

เซนติเมตร ขี้นเป็นกลุ่ม ลำต้นเป็นไหლเอือยหอดไปตามพื้นดิน ส่วนของต้นมีขนปกคลุม ในประกอบมีใบอยู่ ๓ ใบ ใบย่อยรูปหัวใจ ปลายใบเว้า ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองมี ๕ กลีบ ออกดอกตลอดปี ผลเป็นฝัก

หญ้าเกล็ดหอยจีน ไม้ต้นเล็กๆ

ใช้ทั้งต้น รสเบรี่ว่า สรรพคุณ แก้พิษร้อนภายใน แก้อาเจียนเป็นโลหิต ผสมสรวาม

แก้ลำคออักเสบ แก้ฟันปลิด แก้ต่อมน้ำลายและต่อมทอนซิลอักเสบ ต้มออกแก้วดฝี แก้ฝี อักเสบ



ขัดมอน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Sida rhombifolia* L.

ชื่อวงศ์ MALVACEAE

ชื่อสามัญ หญ้าขี้ดใบขาว

ขัดมอน ไม้ต้นเล็กๆ จำพวกหญ้า

ราก เป็นเมือก รสขม สรรพคุณ แก้เบ็พิษ ไข้กาฬ แก้ไข้หัด ถูกไส ดำเนง ฝีดาษ แก้ร้อนใน แก้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ แก้ปวดดลูก

ใบ(ตัวเมีย) ผสมกับเหล้าดีมและทา แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

ขัดมอนตัวผู้ ยอดจะคำ ใช้ราก บำรุงกำหนด ตัน ใช้แก้กระษัย แก้ปวดเมื่อย





ขลุ่



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pluchea indica* Less.

ชื่อวงศ์ COMPOSITAE

ชื่อain หนวดจิ้ว หนวดจั่ง หนวดวัว (อุดรธานี) ขี้ป่าน
(แม่ย่องสอน) คลุ (ใต้)

ลักษณะ ขลุเป็นไม้พุ่ม ยอดและใบอ่อนมีขนอ่อนอยู่ทั่วไป ใน
ติดตามข้อสลับกัน ก้านใบสั้น ใบรูปไข่หัวกลับ ขอบในหยัก

ขลุ (หนวดวัว) ไม้พุ่มตัวเล็กๆ ลำพักหญ้า

ต้น รากหอยฝาดเม้าเต้ม สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ
ใบ คั่วให้เกรียม รากหอยเย็น สรรพคุณ ชงน้ำรับประทาน ขับปัสสาวะ แก้กระหายน้ำ
เปลือก รสมاءเบือเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ริดสีดวงจมูก แก้ริดสีดวงทวารหนัก



ขอบชนาง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pouzolzia pentandra* Benn.

ชื่อวงศ์ URTICACEAE

ชื่อain หนองตายอยากแดง(ภาคกลาง) หนองขา(ภาคกลาง) ขอบชนางแดง หญ้าหนองตายขา
หญ้าหนองตาย(เหนือ) หญ้ามุกนาย(สระบุรี) ขอบชนางขา

ลักษณะ เป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า เลื้อยแฝپตามดิน มีลำต้นขนาดโตกว่าก้านไม้ขีดไฟเล็กน้อย ใบเป็น
ใบเดี่ยวออกสลับกัน เส้นใบจะเห็นเด่นชัดเป็น ๓ เส้น สีใบของขอบ
ชนางขาเป็นสีเขียวอ่อนๆ มีขนเล็กน้อยบนแผ่นใบ ดอกมีขนาดเล็กและออกเป็นกระจุก
ระหว่างซอกใบ

ขอบชนาง ไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า มี ๒ ชนิด คือ แดงขา มี สรรพคุณเหมือนกัน

ใช้ทั้งต้น รสมاءเบือเล็กน้อย สรรพคุณ ขับโลหิตประจำเดือน ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ
แก้กามโรค



หญ้าคา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Imperata cylindrical* Beauv.

ชื่อวงศ์ GRAMINEAE

ชื่ออื่น คา คาดหัว ลาลาง ลาแล (มลายู)

ลักษณะ หญ้าคาเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปี มีเหง้าสีขาวแข็ง
อยู่ใต้ดิน ลำต้นตั้งตรง สูงได้ถึง ๑๕ - ๒๐ เซนติเมตร มีกาบใบ
โอบหุ้มอยู่ กากใบค่อนข้างเรียบและริมกาบใบมีขน ตัวใบยาว

เรียว ยาวประมาณ ๑ - ๒ เมตร กว้างประมาณ ๔ - ๑๘ มิลลิเมตร ส่วนกลางใบกว้างกว่าโคน
ใบและปลายใบ มีขนเป็นกระჯุกอยู่ระหว่างรอยต่อของตัวใบและการใบ ออกดอกเป็นช่อยาว
ประมาณ ๕ เซนติเมตร การปลูกหญ้าคาใช้เมล็ดหรือไอล ปลูกง่าย ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา
เป็นวัชพืชที่พับได้ทั่วไป ไม่ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าคา

หญ้าคา ไม่ก่อ ใบยาวแหลมคม

ราก หวานเย็นเล็กน้อย สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้ร้อน
ในกระหายน้ำ บำรุงไต แก้ดีช่าน
แก้ตับอักเสบ แก้อ่อนเพลีย แก้เบื้องอาหาร



โคกกระสุน(กาบินหนี)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tribulus cistoides*

ชื่อวงศ์ ZYGOPHYLLACEAE

ชื่อสามัญ Caltrops

ชื่อพื้นบ้าน หนามดิน, กาบินหนี

ลักษณะ พืชคลุมดินต้นเดียว ใบรวมแตกแขนงเป็นคู่

ดอกสีเหลือง กลีบบานเท่ากัน ๕ กลีบ บานในตอนเช้า อาศัยผึ้งช่วยผสมเกสร

โคกกระสุน(กาบินหนี) จำพวกหญ้าใบคล้ายผักกระเฉด

ต้น ใบ รสเค็มเข้มเล็กน้อย สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้กระษัย แก้ปัสสาวะพิการ





หญ้างวงช้าง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Heliotropium indicum* Linn.

ชื่อวงศ์ BORAGINACEAE

ชื่อท้องถิ่น หญ้างวงช้างน้อย(เหนือ) กุนอกามโน(มลายู)ฯ

ลักษณะ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก สูงประมาณ ๓๐-๖๐ ซม.

ลำต้นและใบมีสีเขียวอ่อนน้ำ้ แต่กิ่งก้านสาขามาก มีขนปก

คลุมทั่วทั้งใบและลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยว ปลายแหลม ผิวสากขรุขระ ดอกออกเป็นช่อที่ยอด ดอกเล็กสีขาวอมฟ้า เป็นช่อโค้งเหมือนงวงช้าง ผลสีดำรูปไข่เมื่อกดเล็ก

หญ้างวงช้าง ไม้ตันเล็กๆ

ใช้ทั้งต้น สรสีน สรรพคุณ แก้พิษตานชาต ลดไข้ในเต็ก
แก้กระหายน้ำ ละลายก้อนน้ำ้ แก้โรคตา ไม่ควรใช้ติดต่อกันนาน
ในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร



จันใบหอม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Polygonum odoratum*

ชื่อวงศ์ POLYGONACEAE

ชื่ออื่น ผักไฝ ผักแพ้ว จันทร์โสม พริกม้า หอมจันทร์

ผักเจา จันทร์แดง พริกบ้า

ลักษณะ ผักแพ้วเริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นและ ลำต้น สูง ๓๐ - ๓๕ ซม. ลำต้นตั้งตรง บนลำต้นมีข้อเป็นระยะๆ บริเวณข้อมักมีรากออกอกราก หรือลำต้นทอด เลี้ยงไปตามพื้นดิน และมีรากออกอกรากตามส่วนที่สัมผัสกับดินใบ เป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับ รูปร่างของใบเป็นรูปหอกหรือรูปหอกแกรมรูปไข่ ขอบใบเรียวปลายใบแหลม

จันใบหอม (ผักกระเสิม ผักแพ้ว) ไม้ตันเล็กๆ จำพวกหญ้า

ใช้ทั้งต้น สรสีน สรรพคุณ ขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้ร้าดุพิการ
ขับโลหิตระดูสตรี

หญ้าขันกด(หญ้าหวาน)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Panicum repens* Linn.

ชื่อวงศ์ POACEAE

ชื่ออื่น หญ้าขันกด แ xen มัน หญ้าอ่อนน้อย (เชียงใหม่)

ลักษณะ เป็นวัชพืชประเภทใบแคน อายุหลายปี ลำต้นมีทั้งที่เป็น

เหง้าใต้ดินและลำต้นตั้งตรง ไม่แตกแขนง ปล้องรูปทรงกระบอกวง ในเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีวยาว ขอบใบสากระเบิดน้อย ช่อดอกเป็นแบบช่อแขนง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและเหง้า

หญ้าขันกด(หญ้าหวาน)



หัว รากจืดเย็น สรรพคุณ แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ขับปัสสาวะแก้อการบวนน้ำ้เนื่องจาก
โรคไตและโรคหัวใจ ลดความร้อน แก้พิษเข้ากារ



หล้าไช

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Leersia hexandra* Sw.

ชื่อวงศ์ POACEAE

ลักษณะ หล้าไชเป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู จัดเป็น
หล้าสะเทินน้ำสะเทินบกชนิดหนึ่ง ชอบขึ้นในน้ำ
หรือริมตลิ่งและ ๆ มีรากหยั่งลงดิน ลำต้นตั้ง แต่

ค่อนข้างอ่อนแอบไม่แข็งมาก มีเหลืออยู่ติดดอกและซ่อดอกมีลักษณะคล้ายข้าว แต่ดอกมี
ขนาดเล็กกว่า และก้านซ่อดอกมักมีสีเข้มพู

หล้าไช พืชจำพวกหล้าเกิดอยู่ในน้ำ

ใช้หั้งต้น รสจืดชื่น สรรพคุณ ขับฟอกโลหิตประจำเดือนสตรีให้เป็นปกติ แก้ปวดดลูก



หล้าดอกขาว (หล้าหมอน้อย)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Vernonia cinerea* Less

ชื่อวงศ์ Compositae

ชื่ออื่น หล้าสามวัน ก้านธูป ถั่วระยะดิน ผั่งโตก
หล้าละอง หล้าหมอน้อย หนองหนาน
หล้าดอกชิง หล้าเหล่ายก หล้าเหนียวมีช้าง
เชี่ยวไช(จีน)

ลักษณะ ไม่มีลักษณะจำพวกหล้า มีขี้นกระเจยทั่วไปตามที่กรรวางข้างทาง ข้างบ้านทุกภาคของประเทศไทย
ซึ่งคนส่วนใหญ่จะพบเห็นเป็นประจำ แต่ไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไร คิดว่าเป็นต้นหล้าที่
หาประโยชน์ไม่ได้

หล้าดอกขาว (หล้าหมอน้อย) ดอกอ่อนเป็นสีน่วง

ต้น รสเย็นจืด สรรพคุณ ขับพยาลม แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ

ใบสด รสเย็น สรรพคุณ ตัวพอก ถอนพิษแก้อักเสบ

ดอก ชงชาดีเมื่อผลการอยากบุหรี่ ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ





หญ้าตีนกา



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Eleusine indica* (L.) Gaertn.

ชื่อวงศ์ Poaceae-Gramineae

ชื่ออื่น หญ้าตีนก หญ้าปากคอก Goose Grass

ลักษณะ หญ้านาดกลาง สูง ๓๐-๘๐ ซม. กาบใบและแผ่นใบแบบข้าง เขียวใบเป็นกลุ่มขញยา ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว ๑๐-๑๕ ซม. แตกแขนงย่อย เรียกเป็นรูปนิ้วมือที่ปลายก้านช่อดอก และมีช่อแขนงย่อย ๑-๒ ช่อ ติดต่ำกว่าช่อนิ้วมือเล็กน้อย ช่อดอกย่อยแบบข้าง มี ๔-๖ ดอก ย่อย กาบช่ออยู่อย่างล่างและกาบช่ออยู่บนมีเส้นสัน ๑-๒ เส้น

หญ้าตีนกา

ต้น รสมุนเย็น สรรพคุณ ลดความร้อน แก้พิษไข้กาฬ บำรุงหัวใจ ทำผksamสุราท่าแก้ฟกบวม อักเสบแก้ปวดและปวดร้อนตามร่างกาย



หญ้าตีนก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Eleusine indica* (L.) Gaertn.


ชื่อวงศ์ GRAMINEAE

ชื่ออื่น หญ้าตีนก

ลักษณะ หญ้านาดเล็ก สูง ๕๐-๗๐ ซม. ลำต้นเป็นไหหลอดอนอน โคนและขอบใบมีขันยา ช่อดอกแบบช่อกระจะคล้ายช่อเชิงลด แตกแขนงย่อย ยาว ๙-๑๕ ซม. จำนวน ๒-๔ ช่อ เรียกเป็นรูปนิ้วมือที่ปลายก้านช่อดอก ช่อดอกย่อยเกิดเป็นคู่เรียงสลับบนแกนกลางด้านเดียว กาบช่ออยู่อย่างล่างเป็นเกล็ดขนาดเล็ก กาบช่ออยู่บนมีขันยาหนาแน่นที่ขอบกาบล่างของดอกย่อยล่าง ขอบมีขันยาหนาแน่น หญ้าตีนก ไม่ต้นเล็กคล้ายมากดินน้ำค้าง

ต้น รสมุน สรรพคุณ บำรุงน้ำดี บำรุงธาตุ แก้ไข้เพื่อดี แก้ร้อนในกระหายน้ำ





หญ้าไต่ใบ (ลูกไต่ใบ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Phyllanthus urinaria* L.

ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น ไฟเดือนห้า มะขามป้อมดิน หมากไ胥ะหลัง

ลักษณะ ไม้ล้มลุก ใบเรียงสลับบนเดียว ใบเดียว รูปขอบขนาน

โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบสีม่วงแกมน้ำตาล ดอกช่อออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่
บนต้นเดียวกัน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดียว ดอกเพศผู้ออกเป็นกระฉุก สีนวล ผล ผลแห้งแตก
ได้ มีพิษรุนแรง และขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าลูกไต่ใบ

หญ้าไต่ใบ (ลูกไต่ใบ) เม็ดตันเล็กๆ

ใช้หั้งต้น รสมะยืน สรรพคุณ ระงับความร้อน แก้พิษไข้ แก้ไข้มาลาเรีย แก้กามโรค

ขับกระดูกขาวทำสมสุราพอกแก้พิษฝี แก้ฟกบวม

ลูกไต่ใบมีสามชนิด คือ สีแดง(รสเผ็ด หวานแพร่) สีเขียว(ใช้แก้โรคไข้หับคุด+ฝางเสน)

สีขาว(รสขม แก้ไข้)



ตำແຍແມວ


ชื่อวิทยาศาสตร์ *Acalypha indica* Linn.

ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น ตำແຍແມວ (ภาคกลาง), 航道ແມວ (ภาคเหนือ)

ตำແຍແມວ (ตำແຍຕັ້ງຟູ້)

ราก รากชี้น สรรพคุณ ขับเสมหะ ทำให้อาเจียน ทำให้
ระคายเคืองทางเดินอาหาร





หญ้าถอดปล้อง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Equisetum debile Roxb.ex Vauch*

ชื่อวงศ์ *EQUISETACEAE*

ชื่อสามัญ *Horsetail*

ชื่อท้องถิ่น หญ้าเงือก หญ้าหูหนวก(เหนือ) เครือเชาะ ปอยยา แยปอ
(กระเหียง - แม่ฮ่องสอน) หญ้าสองป้อง

ลักษณะ พืชเมี้ยท่อลำเลียงชั้นต่ำ ขนาดสูงประมาณ ๑ เมตร มีเหง้าอยู่ได้ ๑๕ จุด ลำต้นตั้งตรง ขนาดเล็ก สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑-๒ มิลลิเมตร มีข้อปล้องเห็นชัดเจน ภายในกลวง ด้านนอกเป็นร่องตามยาว ผิว滑 แตกกิ่งก้านตามข้อ ใบเป็นกาบเล็กๆรูปพันเดี่ยว เชื่อมติดกันรอบข้อ สีน้ำตาลหรือขาว ซึ่งหลุดร่วงง่าย สีบันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์ขนาดเล็กที่ยอด

หญ้าถอดปล้อง จำพวกไม้บ้ำ

ต้น รสจืดเย็น สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้นิ้ว บำรุงไต ขับระดูขาว



โทางเทง (โคมจีน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Physalis angulata L.*

ชื่อสามัญ *Hogweed, Ground Cherry*

ชื่อวงศ์ *SOLANACEAE*

ชื่ออื่น ต้อมตอก บاتومตอก (เขียงใหม่) ตะงเหล้งเช้า (จีน)

บุ่งปิง (ปัตตานี) ปิงเปง (หนองคาย)

ลักษณะ เป็นสมุนไพรเล็กๆ จำพวกหญ้า ต้นสูงประมาณครึ่งฟุต ถึง ๒ ฟุต ใบกลมคล้ายใบพิมเสน แต่เล็กกว่าและบางกว่ามาก ดอกสีเหลือง ผลกลมพองเหมือนโคมจีนปลายแหลม โตประมาณเท่าลูกพุทราเขื่องๆ งามน่าดู มีขี้น้อยๆตามที่ชุมชื้น และกรร江ว่างเปล่าทั่วๆ ไป คนจีนนิยมปลูกกันตามสวนยาจีน และนิยมใช้กันมาก เพราจะรู้สรรคุณดี สำหรับไทยเราไม่ค่อยมีเครนนิยมกันนัก

โทางเทง (โคมจีน)

ใช้ทั้ง ๕ รสเย็น สรรพคุณ แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้เจ็บในลำคอ แก้发烧ปวดแสบร้อน ฝนหยาดตก แก้ตาแพะ แก้ปวดเคืองในลูกตา แก้ตาอักเสบ





หญ้าน้ำดับไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lindenbergia philippensis* (cham.) Benth.

ชื่อวงศ์ SCROPHULARIACEAE

ชื่อท้องถิ่น หญ้าดับไฟ บัวยาพา กิมยายโพเช่า

ลักษณะ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง สูง ๓๐ - ๑๐๐

เซนติเมตร แต่กิ่งก้านน้อย ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจักเล็กๆ ผิวใบ
บนมีขนประปราย ด้านล่างมีขนน้อยกว่า ดอกช่อกระจะ ช่อด้วยสันๆ ออกที่ปลายกิ่ง
ดอกย่อยเรียงตัวชิดกัน ในประดับเรียวเล็ก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ส่วนโคนปลายแยก ๕ แฉก
ดอกสีเหลืองกลีบเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยกเป็นสองส่วน
ส่วนล่างแยกสามแฉก ผลเป็นฝักรูปกลม ปลายแหลม



หญ้าน้ำดับไฟ

ต้น ใบ ราก รสเย็น สรรพคุณ ตำคันอาอน้ำท้า แก้ปวดแสง

ปวดร้อน แก้แพลงุพอง

ใบ รสเย็น สรรพคุณ ทำผอมสมสุรา พอกแก้พิษฟี แก้ปวดบวม

แก้พิษไฟไหม้ น้ำร้อนลวกสุกศีรษะเด็กเวลาเย็น แก้หัวดัดดจมูก

ราก รสเย็น สรรพคุณ แก้พิษสูน์ขัด

ใช้หั้ง๕ รสมเย็น สรรพคุณ ดับพิษร้อน แก้ไข้



หญ้าน้ำนมราชสีห์

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Euphorbia hirta* Linn.

ชื่อวงศ์ Euphorbiaceae

ชื่ออื่น นมราชสีห์ ผักไขมแดง หญ้าน้ำหมึก

ชื่อสามัญ Garden spurge, Asthma weed, Snake weed

ลักษณะ ไม้ล้มลุกสูงประมาณ ๓๐ - ๔๐ ซม. ลำต้นมีขนละเอียดสีน้ำตาล

อ่อน มีน้ำยางขาวไหลซึมหากเกิดบาดแผล ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปขอบขนาน
ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน กว้าง ๑.๐ - ๑.๕ ซม. ยาว ๒ - ๔ ซม. ดอกแยกเพศ

ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ในประดับรูปถ้วยสีเขียวเข้ม ผลทรง
กลม มี ๓ พู เมื่อแก่สีเหลือง ผลแห้งแล้วแตก เมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาลแก่หรือแดง

หญ้าน้ำนมราชสีห์

ต้น รสมเย็น สรรพคุณ แก้ปัสสาวะมีสีแดงเหลืองขุ่น บำรุงน้ำนมต่ำกับเหล้าข้าวомแล้วให้

เหล้าค่อยๆผ่านคอ วันละ๒-๓ครั้ง แก้ต่อมTHONซิลลักษณะ





หญ้าหนวดปลาดุก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl

ชื่อวงศ์ CYPERACEAE

ชื่อสามัญ Tall fringe rush

ชื่อพื้นบ้าน หญ้าหนวดแมว, หญ้าไข่กบ, หญ้าไข่เขียวด

ลักษณะ วัชพืชอายุถ้วนเดียว ชอบขึ้นตามที่ชื้นและ เป็นวัชพืช

ร้ายแรงในนาข้าว ลำต้นแข็ง สูงประมาณ ๒๐-๕๐ ซม. ใบเรียบ

เรียวยาว ปลายใบมน ขีนเป็นกอกใหญ่และเจริญรวดเร็ว มีลักษณะคล้ายกับหญ้าหนวดแมว

แต่ต้นเล็กกว่า ก้านข้อดอกรกลม ข้อดอยอยเป็นตุ่มรี ออกดอกตอนต้นปี

หญ้าหนวดปลาดุก

ใช้ทั้งต้น รสเผ็ดสุขุม สรรพคุณ บำรุงโลหิต เจริญอาหาร แก้ไข้มาลาเรีย แก้ไข้พومةเหลือง
แก้ไอ แก้หืด บำรุงน้ำนม



หญ้าหนวดแมว (พยับเมฆ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq.

ชื่อสามัญ Java tea, Kidney Tea Plant, Cat's Whiskers

ชื่อวงศ์ Lamiaceae (Labiateae)

ชื่ออื่น บางรักป่า (ประจำบัวศรีชันธ์) พยับเมฆ (กรุงเทพฯ)

อีตุ่ดง (เพชรบูรณ์)

ลักษณะ พืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นก梗อ่อนเป็นสีเหลี่ยม สูง ๐.๓-๐.๘

เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ขอบใบ

หยัก แผ่นใบสีเขียวเข้ม ดอกช่อ ออกตรงปลายยอด มี ๒ พันธุ์ ชนิด

ดอกสีขาวอมม่วงอ่อน กับพันธุ์ดอกสีฟ้า นานจากล่างขึ้นข้างบน เกสรเพศผู้เป็นเส้นยาวยืน

ออกนานอกกลีบดอก ผลแห้งไม่แตก

หญ้าหนวดแมว (พยับเมฆ)

ต้น รสจืด สรรพคุณ ขับปัสสาวะ ขับนิว แก้กระซຍ แก้ปวดเมื่อยบั้นเอว ใช้มากเป็นอันตราย
กดหัวใจทำให้หยุดเต้นได้





หญ้าปราบ (ไดไมรู้ล้ม)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Elephantopus scaber* Linn.

ชื่อวงศ์ Asteraceae

ชื่ออื่น ขี้ไฟฟอกคุ่ม คงไฟฟอกคุ่ม เดย์บี ตะซี โกระ หญ้าไก่นกคุ่ม

หญ้าปลับ หญ้าไฟฟอกคุ่ม หญ้าสามสิบสองห้าบ หนาดพา

ลักษณะ ใบมีขนสีขาวตรงกลาง เอียง ตรง ห่าง สากระดูดขนาดกับผิวใบ

ทั้งสองด้าน ห้องใบมีขนมากกว่าหลังใบในรูปหอกกลับ หรือรูปไข่แגםใบหอกกลับ แผ่นใบยาว ๘-๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๓-๕ เซนติเมตร ส่วนที่ค่อนไปทางปลายใบ ผายกว้าง แล้วสอบแหลม ทุ่ง ส่วนโคนใบสอบแคบจนถึงก้านใบ ขอบใบหยักมน หรือจักพันเลี้ยวห่างๆ เนื้อใบหนาสา กก้านใบยาว ๐.๕-๒ เซนติเมตร หรือไม่มีก้านใบ รากที่มีอายุมากจะมีลักษณะคล้ายเหง้า ราก แขนงกลมยาว ทั้งต้นมีรากร้อยขึ้น

หญ้าปราบ (ไดไมรู้ล้ม)

ใช้ทั้งต้น รสจืดขึ้น สรรพคุณ แก้ไข้ แก้กระษัย แก้ปัสสาวะพิการ บำรุงกำหันด



หญ้าปากควาย

ชื่ออื่นๆ : หญ้าปากกลัว

ชื่อสามัญ : Beach wiregrass, Crowfoot grass, Yaa paak khwaai

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dactyloctenium aegyptium* (L.) P. Beauv.

ชื่อวงศ์ : Gramineae (Poaceae)



ลักษณะพอกษาศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ลำต้นกลม

เป็นปล้องกลวง กว้าง ๕ มม. ลำต้นตั้งสูงประมาณ ๒๐ ซม. มักแตกต้นใหม่ จำกัดที่ติดอยู่กับพื้นดินแล้วมีราก ใบรูปไข่หอกกลับ ยาวประมาณ ๖ - ๙ ซม. ปลายแหลม โคนเรียวมน มีขนเห็นชัด ดอกเป็นช่อ ก้านดอกกลมยาว ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ซม. ปลายก้านดอกมีช่อดอกอยู่ต่อจากจุดกึ่งกลาง

๓ - ๖ ช่อ แต่ละช่อยาวประมาณ ๓ - ๔ ซม. ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีขาวแซมเขียว แบบๆ

ออกเรียงติดกัน ผลมีลักษณะเป็นผลรวมในผลหนึ่งๆ จะมีเมล็ดอยู่จำนวนมาก

หญ้าปากควาย มี ๔ , ๕ , ๖ หรือ ๗ แฉก

ใช้ทั้งต้น รสเย็น สรรพคุณ ตับพิษภาพ แก้ไข้พิษไข้หัวทุกชนิด ช่วยย่อยอาหาร แก้พิษฝี แก้ไข้ตรีโภ



หญ้าปราบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Elephantopus scaber* Linn.

ชื่อวงศ์ ASTERACEAE

ชื่ออื่น อี้ไฟนกคุ่ม ดิงไฟนกคุ่ม เคยโปี หญ้าไก่นกคุ่ม
โด้ไม่รู้ล้ม หญ้าสามสิบสองหาน หนาด มีแคลน
ลักษณะ ไม้ล้มลุก ลำต้นสั้น ใบเดี่ยว เรียงสลับเป็นวง
รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ กว้าง ๒-๖ ซม. ยาว
๑๐-๒๕ ซม. มักแผ่รากไปกับผิวดิน ขอบใบหยักฟัน



เลือย ท้องใบมีขันมากกว่าหลังใบ ดอกช่อ แหงออกจากกลางต้น ก้านช่อแตกแขนงได้ ดอก
ย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีม่วง ออกเป็นกระจุกที่ปลายก้านดอก รองรับด้วยใบประดับแข็ง ผล
แห้ง ไม่แตก

หญ้าปราบ / ผักปราบ ไม้มีเลื้อยพาดพันต้นไม้

หัว รสหวานเล็กน้อย สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงตับ ปอด หัวใจ
ใบ ใช้ใบต้มน้ำกินเป็นยาขับปัสสาวะ ขับพยาธิได้ดี กระตุ้นกำหันด้ด

ไผ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bambusa* sp.

ชื่อวงศ์ GRAMINEAE/POACEAE

ชื่อสามัญ Bamboo

ไผ่ พืชจำพวกหญ้า เป็นกอ ตระกูลเดียวกันมีดังนี้

ไผ่ป่า มีห่านาม

ไผ่สีสุก มีห่านาน้อย ต้นใหญ่กว่า

ไผ่บง ไม่ห่านาม ลำใหญ่

ไผ่ลาย มีลำเป็นสีลายสวยงาม

ไผ่รวง ลำเล็ก แข็ง มีห่านาน้อย

ไม้จำพวกนี้แหงหน่ออ่อนๆ รับประทานอาหารได้ทั้งสิ้น สรรพคุณ เหมือนกัน

ใบ รสขื่นเปื่อน สรรพคุณ พอกล้างโลหิตระดูที่เสีย

ตา สมเป็นค่าน รสจีด สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ดูดแก๊สในกระเพาะอาหาร

ราก รสเผื่อน สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ แก้หนองใน ขับระดูสตรี





ไผ่เหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Phyllostachys sulphurea* (Carr.) A.&C. Riv.

ชื่อวงศ์ GRAMINEAE

ชื่อพื้นเมือง ไผ่เหลือง

ลักษณะ ผิวเกลี้ยง สีเหลืองมีเส้นแอบสีเขียวอ่อนตามยาว ไม่มีหนาม
มีกาบหุ้มเห็นข้อปล้องชัดเจน

ไผ่เหลือง ไม่ยืนต้นเป็นกอ ลำเหลือง

ตาไไฟ สรรคุณ เอา ๗ ตาต้มรับประทานแก้สตรี
ตกโลหิตมากเกินไป



หญ้าฝรั่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Crocus sativus* L.

ชื่อวงศ์ Iridaceae

ชื่อสามัญ Crocus / Saffron



ลักษณะ หญ้าฝรั่นเป็นพืชล้มลุก มีลำต้นใต้ดิน ซึ่งมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวเผือก (Corm) ใบยาวแคบ ออกดอกในฤดูใบไม้ร่วง โดยก้านดอกจะแหงออกมายาวหัวใต้ดิน ลักษณะดอกมีรูปร่างคล้ายดอกบัว กลีบดอกเรียวยาวคล้ายรูปไข่ มีเกษรขนาดยาวโผล่พ้นเหนือดอก เกษรตัวเมียมีสีแดงเข้ม ดอกอยู่ได้นานประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ การเก็บดอกหญ้าฝรั่นนั้น ควรเก็บเมื่อดอกเริ่มบาน ส่วนที่นำมาใช้คือเกษรตัวเมียม โดยเด็ดออกจากดอกแล้วนำมาทำให้แห้งโดยการย่างบนเตาถ่านเพื่อให้เสียน้ำ ซึ่งดอกหญ้าฝรั่น ๑๐๐,๐๐๐ 朵 กะให้เกษรตัวเมียมีหัวหรือหญ้าฝรั่นประมาณ ๑ กิโลกรัม หญ้าฝรั่นจึงมีราคาแพงมาก เท่าราคากองคำเลยที่เดียว ประเทศไทยยังไม่มีการปลูกหญ้าฝรั่น ประเทศที่ปลูกหญ้าฝรั่นเพื่อส่งออกคือ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิหร่าน อินเดีย

หญ้าฝรั่น ไม้จากประเทศไทย

ใช้เกสร รสมนหวานเล็กน้อย สรรพคุณ บำรุงธาตุ บำรุงโลหิต ชูกำลัง แก้สิว แก้ไข้ แก้ตับ ไต แก้โรคเส้นประสาท แก้ชางเด็ก บำรุงสายตา บำรุงสมอง





หญ้าพันธุ์ขาว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Achyranthes aspera* Linn.

ชื่อวงศ์ Amaranthaceae

ชื่อสามัญ Prickly chaff-flower

ชื่ออื่น หญ้าพันธุ์ขาว หญ้าพันธุ์ขาวเข้า หญ้าตีนนกขาว ควายุ หญ้าโคคูยู
ลักษณะ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ ๓๐ - ๑๐๐ ซม. หรือมากกว่า
แตกกิ่งก้านเป็นคู่ๆ และสามารถทอดกิ่งนอนไปตามพื้นดินแล้วเกิดราก
บริเวณข้อได้ ใบเดี่ยวรูปเรียบแกมขอบมน ผิวใบมีขนสั้นละเอียดสีขาวนุ่ม
ถึงกลม โคนสอบแคบมน ผิวใบมีขนสั้นละเอียดสีขาวนุ่มทางติดจำนวน
มาก ดอกออกเป็นช่อยาวที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยเกาะติดห้อยหัวแนบกับ

ก้านช่อ และมีจำนวนมาก ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงที่ส่วนปลายเป็นหนามแหลมแข็ง ผลมีผิวเรียบ
รูปทรงกระบอกปลายตัด เมล็ดรูปทรงกระบอกรีหัวและท้ายเรียว ผิวเรียบสีน้ำตาลเหลือง

หญ้าพันธุ์ขาว

ใช้ทั้งต้น รสจืดชื่น สรรพคุณ ช่วยย่อยอาหาร แก้ไข้ตื้อชา แก้พิษฝี ขับปัสสาวะ แก้นิ้ว



หญ้าพันธุ์เขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl

ชื่อวงศ์ VERBENACEAE

ชื่อสามัญ Brazilion Tea

ชื่ออื่น พันธุ์เขียว หญ้าหางยู ฉลกบาท

ลักษณะ พืชล้มลุก สูงประมาณ ๕๐ ๖๐ เซนติเมตร ใบเดี่ยว
ออกเป็นคู่ตรงข้าม ใบรูปไข่แกมรูปรี ขอบใบจักฟันเลื่อย

ดอกออกเป็นช่อยาวที่ปลายยอด ก้านช่อดอกกรุ่นกระบอก กลีบดอกสีม่วงอ่อน ดอกนาน
จากล่างขึ้นบน

หญ้าพันธุ์เขียว(หญ้าน้ำดับไฟ)

ใช้ทั้งต้น รสจืด สรรพคุณ ขับเหื่อ ขับปัสสาวะ บรรเทาโรคเบาหวาน





หญ้าพันธุ์แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cyathula prostrata* Blume

ชื่อวงศ์ AMARANTHACEAE

ชื่อท้องถิ่น อั้งเกย หญ้าควยງู

ลักษณะ พืชล้มลุกขนาดเล็ก สูง ๒๐-๔๐ เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อ มีสีแดง ผิวเปลือกลำต้นเรียบเกลี้ยง หรือมีขนเล็กน้อย ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม ใบเป็นเหลี่ยม

โคนใบมนปลายแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตั้งตรงบริเวณปลายยอด ช่อดอกกว้าง ๑๐-๒๐ เซนติเมตร

หญ้าพันธุ์แดง ปกติพืชจะมีสีเขียว อยู่กลางแจ้งมีสีแดง

ต้น รสจืด สรรพคุณ แก้ขัดเบา

ใบ รสจืดเย็น สรรพคุณ แก้คออักเสบ เป็นเม็ดเป็นหนองในคอ

ดอก รสจืด สรรพคุณ แก้سم hallucinogen ในทรงอก ละลายก้อนนิ่ว

ราก รสจืด สรรพคุณ ขับปัสสาวะ

ใช้หั้งต้น รสจืดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ แก้อักเสบในลำคอ



หญ้าแพรก

ชื่อวงศ์ GRAMINEAE

ชื่อสามัญ Burmuda Grass , Wire Grass , Dub Grass

ชื่อท้องถิ่น หนอเกเด

ลักษณะ เป็นวัชพืชที่มีประโยชน์ต่อการรักษาหน้าดิน ทนต่อ การเหยียบย้ำฟื้นตัวและแพร่พันธุ์เร็วมาก จากลักษณะที่ดีอันนี้ เองจึงนิยมเอาหญ้าแพรกมาทำพืชริมคลื่นวันครู เพื่อเป็น ปริศนาสอนศิษย์ ให้มีความอดทนและลดความแตกต่างฐานะ ทางสังคมของศิษย์ไม่ให้แข่งขันหรืออวดรำร่าวย หาซื้อของ กำนัลมาค่ามาให้ครูซึ่งอาจทำให้เห็นคุณธรรมในตัวครูลดลงจาก พฤติกรรมของศิษย์ ได้เป็นกุศโลบายที่ครูอาจารย์ในสมัยโบราณ วางบรรณทัดฐานให้ครูและศิษย์พึงปฏิบัติต่อกัน ด้วยความ เคราะห์ไม่ให้เห็นว่าครูสูงหรือต่ำหญ้าแพรกจึงได้เชื่อว่าอาการ ของแผ่นดิน ปัจจุบัน มีนักเรียนรู้จักหญ้าแพรกสักกี่คน ที่ทราบ และเห็นคุณค่าของชนิดนี้



หญ้าแพรก

ใช้หั้งต้น รสขมเย็น สรรพคุณ แก้พิษเจ็บป่วย แก้อักเสบ แก้สต์เรติกโลหิตมากเกินไป แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้หัด สุกใส ดำเนง



หญ้าพองลม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hygroryza aristata* (Retz.) Nees

ชื่อวงศ์ POACEAE

ชื่อสามัญ Floating grass

ชื่ออื่น หญ้าพองลม หญ้าลอยน้ำ

ลักษณะ พืชล้มลุกอายุหลายฤดู เจริญลอยอยู่บ่อบนผิวน้ำเป็นแพใหญ่ ถ้าน้ำดีน้ำจะฝังในดิน ขอบขึ้นในหนอง บึง หรือที่น้ำไหลชา ๆ มีลำต้นเป็นไหเหลวเรียว เห็นข้อปล้องชัดเจน ใบเป็นรูปไข่ยาวปลายใบแคนมน ฐานใบเป็นรูปหัวใจ กากใบแผ่หุ่มลำต้นและโป่งพองออก ช่วยให้ลอดน้ำได้ดี ดอกออกเป็นช่อสันที่ปลายยอดมีซ่อคล้ายอยู่ในน้ำมากนัก ช่อดอกย่อยมีก้านช่อคล้ายยาว ดอกเป็น朵เดียว

หญ้าพองลม (ปูเจ้าล้อย่า) แม่น้ำ

ต้น รถจีดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ร้อนกระสับกระส่าย



หญ้าแห้วหมู



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cyperus rotundus* Linn.

ชื่อวงศ์ Cyperaceae

ชื่อสามัญ Nut grass, Cocograss

ชื่ออื่น แห้วหมู หญ้าขันหมู

ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นอยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นหัวกลมมีตาจำนวนมาก และสามารถแตกใหม่ไปได้โดยแล้วเกิดหัวใหม่เจริญขึ้น เป็นต้นเห็นได้ชัด ลำต้นสั้น ใบเกิดที่ลำต้นชิดแน่นโดยเป็นกาบใบหุ้มช้อน

ม้วนทับกันชูขึ้นเหมือนลำต้น แล้วแผ่เป็นแผ่นใบแบบรูปແเกบยาวปลายแหลม กลางใบเป็นสันร่องผิวใบเรียบสีเขียวเข้ม กว้างประมาณ ๐.๔ ซม. ยาว ๒๕ ซม. ดอกเกิดที่ปลายยอด ก้านช่อคล้ายเส้นไหมสีเขียวเข้มแหงนขึ้นสูง ยาวประมาณ ๓๐ ซม. แล้วแตกเป็นช่ออยู่อีกหลายช่อ ดอกย่อยมีสีน้ำตาลจำนวนมาก ผลรูปขอบขนาน ปลายแหลมสีน้ำตาลหรือสีดำ

หญ้าแห้วหมู หญ้าขันนิดลงหัว มี ๒ ชนิดเล็กใหญ่ มีสองชนิด คือ แห้วหมูใหญ่(ปรับสายพันธุ์) กับแห้วหมูเล็ก(นิยมใช้ทำยา)

หัว รถชาติดร้อนเผ็ด สรรพคุณ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ขับลมในลำไส้ แก้ท้องชื้น

อีดเพื่อ บำรุงกำลัง บำรุงครรภ์รักษา

